

专业：应用心理学 考试科目：变态心理学/心理咨询与心理治疗(总分150分)

一、心理咨询与心理治疗部分(共75分)

(一)名词解释(共20分，每题4分)

1. 反移情 2. 正强化 3. 对峙 4. 反塑造 5. 负惩罚

二、填空题(共15分，每空1分)

1. 咨询心理学家认为心理咨询有4个主要起源：

(1)与20世纪初的职业指导运动的兴起有关；

(2)_____；

(3)与心理测量运动和心理学中对个体差异的研究有关；

(4)与以罗杰斯为代表的非医学的、非心理分析的咨询与心理治疗的崛起有关。

2. 在合理情绪疗法的ABC理论模型中，A是指诱发事件(Activating events)；B是指个体在遇到诱发事件之后相应而生的信念(Beliefs)；C是指在特定情景下，_____。

3. 森田疗法的治疗过程与实践可用两个基本要点加以概括：(1)顺应自然；(2)_____。

4. 以人为中心治疗会谈的特征性成分：

(1)完全接受来访者所体验到的任何情感、思想等，并对此不加批判；

(2)深刻理解来访者情感和体验所包含的深刻涵义；

(3)_____；

(4)相信“有机体的才智”能够引导治疗者和来访者双双走向来访者问题的内核。

(5)_____。

5. 弗洛伊德有一个著名的观点，即认为人在幼年时期，对异性双亲的眷恋现象是人类普遍存在的特征之一，_____情结即是其用以说明此问题的一个术语。

6. 认知领悟疗法的适宜范围主要为_____、恐怖症和某些类型的性变态(如露阴癖、窥阴癖)。

50分)

7. 行为学家 _____ 的经典条件作用原理试图对条件反射与人类异常行为之间的关联作出解释。这一原理解释人的某些行为是通过学习得来的，而且可以从一种刺激物或情境泛化到另一种刺激物或情境中去。

8. 系统脱敏由三个部分组成：

(1) 放松训练；

(2) _____ ；

(3) 要求来访者在放松的情况下，按等级层次中列出的项目进行想象或实地脱敏。

9. 心理分析的治疗方法包括：_____、释梦、_____、移情、解释。

10. 心理咨询与心理治疗中的关系是一种对来访者进行帮助的关系，这种关系具有如下一些特征：

(1) 独特性；

(2) 客观性与主观性的统一；

(3) _____。

11. 心理分析学说的一个基本概念是：作为一切意识行为基础的是一种_____的心理活动。

12. 班杜拉曾对社会模仿学习进行分析，将其分为以下四个过程：(1) 注意的过程；(2) _____；(3) 运动的再现过程；(4) _____。

(三) 问答题：(共40分，每题10分)

1. 心理咨询与心理治疗的主要区别。

2. 弗洛伊德人格构成理论的主要内容。

3. 以人为中心的治疗理论对人的基本看法。

4. 确立心理咨询与心理治疗目标时的注意事项。

普遍

明癖、

二、变态心理学部分(共75分),

(一)名词解释(共20分, 每题4分)

1. 幻觉 2. 心因性遗忘 3. 人格解体 4. 假性痴呆 5. 神游症

(二)判断题(以是或否作答, 将答案写在题目后括号内)(共15分, 每题1分)

1. 巴甫洛夫被公认为现代行为主义奠基人。()
2. 绝大多数精神分裂症患者存在意识和智能障碍。()
3. 应激理论最早由加拿大著名的生理学家Hans Selye创建。()
4. 精神分裂症单纯型的特点为: 青少年时期发病, 起病缓慢持续进行, 病情自动缓解者少; 早期可出现类似神经衰弱的症状, 继之表现为日益加重的孤僻、被动、生活懒散和情感淡漠, 幻觉妄想不明显。()
5. 情感淡漠指负性情感增强, 表现为忧郁沮丧, 悲观绝望, 感到自己一无是处, 毫无生趣, 度日如年。()
6. 神经症的主要表现是思维障碍。()
7. 人格障碍实际上是指人格解体。()
8. 被害妄想是指个体坚信某些人或某些集团对其进行不利的活动, 进行打击陷害、破坏等。()
9. 研究证实心身疾病中的冠心病的发生发展与A型行为有肯定的联系。()
10. 轻度智力落后的个体智商指数在35至49之间。()
11. 消化性溃疡属于心身疾病。()
12. 分裂样人格障碍以观念、行为和外貌装饰的奇特、情感冷淡及人际关系明显缺陷为特点。()
13. 躯体疾病不可能引起心理障碍。()
14. 变态心理的判别标准之一为社会常模和社会适应的标准。()
15. 错觉是指一种虚幻的知觉体验, 即在没有现实刺激作用于感官时发生的知觉体验。()

(三)问答题(共20分, 每题10分)

1. 人格障碍的共同特征及类别。
2. 柯萨可夫综合征的主要表现。

(四)案例分析(诊断, 诊断依据及鉴别诊断, 20分)

案例: 男性, 26岁, 工人, 未婚。幼年患佝偻病, 躯体发育较迟。学习成绩中等, 中学毕业后即参加工作。个性较孤僻, 为人老实, 胆小怯懦。工作认真, 思维欠灵活。生活中无任何特殊爱好。

其双亲年老多病, 虽有兄妹三人照料, 唯小妹聪明能干, 承担着家庭的主要责任, 其对小妹多有依赖。

5天前, 小妹因意外车祸死亡。其得知噩耗, 顿时浑身发抖, 嚎啕大哭。少顷, 不认识亲人, 并喊叫: “妹妹, 你不能死……这是什么地方……”, 言语不连贯。晚间需服用镇静药方可入睡。次日表现较安静, 但表情茫然, 双目直视, 无任何情绪反应, 有定向力障碍, 尤其以时间定向障碍明显。多卧床不起或呆坐, 难以与人正常交谈, 有时对答不切题, 生活需人协助, 不主动提任何要求。

急诊入住精神卫生机构对症治疗, 四天后意识基本清晰, 定向力恢复, 回答问题切题。结合心理治疗, 探讨如何对待妹妹的意外事件。两周后精神状态完全恢复正常, 对症状发生经过大部分不能回忆。