



2011 年全国硕士研究生统一入学考试自命题试题

学科与专业名称： 口腔医学 口腔临床医学
考试科目代码与名称： 352 口腔综合

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

一 名词解释（共 12 小题，每小题 6 分，共 72 分）

- 1 含牙囊肿 2 上皮附着 3 正中关系 4 三叉神经痛 5 骨整合
6 坚强内固定 7 附着体义齿 8 种植义齿 9 桩冠 10 继发性殆创伤
11 猛性龋 12 引导性牙周组织再生术（GTR）

二 单项选择题（共 50 小题，每小题 2 分，共 100 分）

- 1 口腔恶性肿瘤中，最易沿神经束扩散的是（ ）
A 腺样囊性癌 B 黏液表皮样癌 C 鳞状细胞癌 D 恶性黑色素瘤
- 2 以下哪一项不是口腔扁平苔藓的典型病变（ ）
A 过度角化或过度不全角化 B 细胞的非典型表现 C 钉突变尖呈锯齿状 D 基底细胞液化变性
- 3 根尖肉芽肿内的上皮主要来源于（ ）
A Serres 上皮剩余 B 结合上皮 C 缩余釉上皮 D Malassez 上皮剩余
- 4 关于牙本质龋，以下哪项是错误的（ ）
A 与釉质龋相比，其发展较快 B 常形成一底向内、尖向外的圆锥形病损
C 细菌侵入时可沿牙本质小管侧支扩张 D 最先侵入的细菌可能是产酸菌
- 5 以下各类型的口腔念珠菌病中最可能伴有黏膜白斑的是（ ）
A 急性假膜性念珠菌病 B 急性萎缩性念珠菌病 C 慢性增生性念珠菌病 D 慢性萎缩性念珠菌病
- 6 切取活检组织要有一定长、宽、厚度（深度），切取组织应包括至少____正常组织。（ ）
A 1 cm B 0.5 mm C 1.5 mm D 0.5 cm
- 7 牙源性钙化上皮瘤的病理特征是（ ）
A 具有成釉器样结构 B 具有导管样或花瓣样结构
C 具有成釉器样结构并有影细胞 D 肿瘤细胞核浓染并异型，细胞间桥明显
- 8 涎腺导管中，“吸钠排钾”作用最明显的是（ ）
A 闰管 B 纹管 C 小叶间导管 D 排泄管
- 9 以下关于颞下颌关节的运动说法错误的是（ ）
A 小开颌运动下颌下降约 2cm B 大开颌运动下颌下降约 2cm 以上
C 打哈欠的下颌运动就是最大开颌运动 D 双侧侧方运动是不对称运动
E 后退运动时，髁突还能后退 2-3cm
- 10 先天缺额牙最多发生在（ ）
A 上颌侧切牙 B 上颌第二前磨牙 C 下颌第二前磨牙 D 上下颌第三磨牙
- 11 出切牙孔的血管神经是（ ）
A 腭降动脉及腭神经 B 鼻腭神经及血管 C 腭前神经及腭大血管 D 腭中、后神经及腭小血管

考试科目：口腔综合 A 卷

共 4 页，第 1 页

- 12 牙萌出的时间是指 ()
A 牙出龈的时间 B 牙冠完全萌出的时间 C 牙冠萌出一半的时间
D 牙到达咬合接触的时间 E 牙根发育完成的时间
- 13 对建立正常咬合起重要作用的牙是 ()
A 第一磨牙 B 第二磨牙 C 中切牙 D 第一前磨牙 E 第二前磨牙
- 14 气管切开多在 ()
A 第 1-3 气管软骨环 B 第 3-5 气管软骨环 C 第 1 气管软骨环 D 第 6 气管软骨环
- 15 手术后应加压包扎的是 ()
A 游离皮瓣移植术 B 中厚断层皮片移植术
C 皮管形成术后 D 隧道式皮瓣转移术 E 旋转推进皮瓣术后
- 16 牵张成骨术中适当的牵张速率非常重要, 在颅颌面骨的牵张过程中, 目前认为较适宜的牵张速率为 ()
A 0.5mm/d B 1.0mm/d C 1.5mm/d D 2.0mm/d E 2.5mm/d
- 17 腭裂术后穿孔的修补时机至少在 ()
A 术后 1 月 B 术后 3 月 C 术后 6 月 D 术后 8 月 E 术后 12 月
- 18 一患者, 自觉右侧口底后分、舌根及咽部疼痛, 用 2% 的利多卡因阻滞麻醉三叉神经第 III 支后, 疼痛仍不缓解; 再用 1%—2% 的丁卡因喷雾于舌根部、咽部后, 疼痛缓解。其最可能的诊断是 ()
A 三叉神经第 II 支痛 B 继发性三叉神经痛 C 舌神经痛 D 舌咽神经痛 E 舌下神经痛
- 19 下列关于颞下颌关节内强直描述不正确的是 ()
A 是阻塞性睡眠呼吸暂停综合征的病因之一 B 可有骨性强直和纤维强直
C 对比双侧髁突活动度, 患侧没有或极小, 而健侧则明显
D 发生关节内强直均可导致严重的面下部发育障碍和牙合关系错乱
E 发生骨性强直, 有时下颌骨仍可有数毫米的动度
- 20 腮腺区肿胀、压痛, 导管口正常, 抗炎治疗有效, 分泌物清亮、通畅, 应初步考虑为 ()
A 流行性腮腺炎 B 假性腮腺炎 C 良性腮腺肥大 D 急性化脓性腮腺炎 E 腮腺良性肿瘤
- 21 哪种脉管瘤听诊可有吹风样杂音 ()
A 毛细管型血管瘤 B 海绵型血管瘤 C 蔓状血管瘤 D 淋巴血管瘤 E 淋巴管瘤
- 22 可以主要采用旋转力量拔除的牙齿是 ()
A 上颌切牙 B 下颌切牙 C 上颌双尖牙 D 上颌磨牙 E 下颌磨牙
- 23 颌骨骨折的重要治愈标准是 ()
A 骨性愈合 B 纤维性愈合 C 骨折线上的牙齿不松动 D 恢复原有咬合关系 E 无感染发生
- 24 下列哪项不是腐败坏死性口底蜂窝织炎广泛切开引流的目的 ()
A 消除病灶 B 预防毒素的进一步吸收 C 改变厌氧环境
D 减轻局部压力, 预防呼吸困难 E 充分引流脓液
- 25 关于翻瓣去骨拔除断根, 错误的方法是 ()
A 瓣应足够大, 使视野清楚 B 瓣的基底部位应宽以提供充足的血运
C 翻瓣时应将骨膜保留在骨面以防术后骨感染 D 保证足够去骨间隙, 防止去骨损伤软组织
E 缝合后应保证切口下方有骨支持
- 26 牙列完整的病人经口内注射行上牙槽后神经阻滞进针点是 ()
A 上颌第一磨牙近中颊侧根部前庭沟 B 上颌第一磨牙远中颊侧根部前庭沟
C 上颌第二磨牙近中颊侧根部前庭沟 D 上颌第二磨牙远中颊侧根部前庭沟

- 27 要判断口腔癌晚期有无全身转移,最佳的检查手段是()
A 全身CT B MRI C ECT D D.S.A E B超
- 28 间接固位体最主要的作用是()
A 固位 B 连接 C 分散殆力 D 支持 E 稳定
- 29 具有一型观测线的基牙()
A 近缺隙侧倒凹区大,远离缺隙侧倒凹区也大 B 近缺隙侧倒凹区小,远离缺隙侧倒凹区也小
C 近缺隙侧倒凹区大,远离缺隙侧倒凹区小 D 近缺隙侧倒凹区小,远离缺隙侧倒凹区大
E 近缺隙侧与远离缺隙侧均无倒凹区
- 30 Kennedy 三类缺损者的义齿一般应设计为()
A 粘膜支持式 B 牙支持式 C 混合支持式 D 粘膜支持式或混合支持式 E 不确定
- 31 可摘局部义齿固位体的数目一般为()
A 0~1个 B 1~2个 C 2~4个 D 4~6个 E 尽可能多
- 32 间接固位体安放的位置与哪条线有关()
A 支点线 B 观测线 C 导线 D 支持线 E 外形高点线
- 33 最容易发生脱位的义齿是()
A 固定义齿 B 全口义齿 C 上颌单颌义齿 D 可摘局部义齿 E 下颌单颌义齿
- 34 选择后牙牙尖形态主要考虑()
A 对颌牙的情况 B 旧义齿的牙尖高度 C 病人的意愿 D 支持组织的条件 E 基牙的固位
- 35 下牙列缺失后,下颌骨改变规律为()
A 颌弓后段向上、向外吸收 B 下颌后缩
C 颌弓前段向下、向前吸收 D 牙槽嵴变低、变宽 E 下颌弓逐渐变小
- 36 以下关于后堤区的描述,哪一项不正确()
A 后堤区组织柔软,有一定可让性 B 当义齿承受压力时,该区组织可以随义齿而移动
C 后堤区可在取印模时制作 D 后堤区的范围在两侧翼上颌切迹之间
E 必须在工作模型上制作后堤
- 37 初戴全口义齿时,对义齿作选磨操作顺序是()
A 调磨正中殆早接触点,调磨侧方殆牙尖干扰,选磨前伸殆时牙尖干扰
B 调磨正中殆早接触点,调磨前伸殆时牙尖干扰,选磨侧方殆牙尖干扰
C 选磨前伸殆时牙尖干扰,调磨正中殆早接触点,调磨侧方殆牙尖干扰
D 调磨侧方殆牙尖干扰,调磨前伸殆时牙尖干扰,调磨正中殆早接触点
E 选磨前伸殆时牙尖干扰,调磨侧方殆牙尖干扰,调磨正中殆早接触点
- 38 高嵌体殆面预备时,功能尖的磨除为()
A 0.8mm B 1.0mm C 1.2mm D 1.5mm E 2.0mm
- 39 前牙金属烤瓷唇面龈边缘最佳选择是()
A 龈上凹形边缘 B 龈下肩台边缘 C 龈上肩台边缘 D 龈下凹形边缘 E 平齐龈缘边缘
- 40 关于GTR,以下哪一项描述是错误的?()
A 膜性材料引导牙周膜细胞占领根面 B 不可吸收膜于手术后4-6周取出
C 膜性材料能阻挡牙龈上皮沿根面生长 D 适合骨上袋患者
- 41 下颌第一磨牙颊侧牙周脓肿,自感冷热刺激痛,夜间自发痛,牙髓反应(+++),脓肿切开后,疼痛减轻,一般治疗方法为()
A 先做牙周治疗,立即又做根管治疗 B 牙周治疗
C 先做根管治疗,后做牙周病治疗 D 只做根管治疗

- 42 慢性增生性牙髓炎的特点是息肉 ()
A 充满整个龋洞 B 与牙髓相连 C 与牙龈相连 D 与牙周膜相连 E 与牙槽骨相连
- 43 牙周炎与牙龈炎的根本区别是 ()
A PD \geq 3mm B 牙龈炎症的程度 C 有附着丧失 D X 线片示根周膜增宽
- 44 砷失活剂引起的药物性根尖周炎, 可开髓去除根髓, 在根管内封 ()
A 丁香酚 B 樟脑酚 C 甲醛甲酚 D 碘仿糊剂
- 45 以下哪一种牙髓炎多发生在年青人 ()
A 慢性溃疡性牙髓炎 B 慢性增生性牙髓炎 C 慢性闭锁性牙髓炎
D 急性浆液性牙髓炎 E 急性化脓性牙髓炎
- 46 下列链球菌, 哪种与难治性根尖周炎密切相关 ()
A 轻型链球菌 B 唾液链球菌 C 消化链球菌 D 粪肠球菌
- 47 牙周基础治疗时, 调殆的时机为 ()
A 龈上洁治之前 B 龈上洁治之后 C 龈下刮治之前
D 龈下刮治之后 E 牙周组织的炎症被控制之后
- 48 关于松牙固定术, 下列哪一项错误 ()
A 外伤引起的牙齿松动, 有保留价值者, 可用松牙固定术
B 松牙固定中钢丝结扎的位置在舌隆突之下
C 如松牙能行使咀嚼功能且无不适, 则不必固定
D 松牙固定前应先消除殆干扰
E 牙周常规治疗后炎症已控制, 但牙齿仍松动的, 可用松牙固定术
- 49 口腔念珠菌病最主要的病原菌是 ()
A 高里念珠菌 B 假热带念珠菌 C 白色念珠菌 D 热带念珠菌 E 类星型念珠菌
- 50 多形渗出性红斑在皮肤上的损害为 ()
A 下肢伸侧结节状多形红斑 B 口腔、生殖器发生固定性红斑
C 颜面、手掌、足底呈对称性虹膜状红斑 D 躯干、四肢、面部呈固定性红斑
E 面部、胸部呈带状红斑

三 问答题 (共 8 小题, 每小题 16 分, 共 128 分)

- 1 简述干槽症的病因, 临床表现及治疗原则?
- 2 一名交通事故导致的口腔颌面部创伤患者, 伤后立即急诊入院, 应作哪些检查及处理?
- 3 简述全口义齿修复确定垂直距离的方法?
- 4 临床上固定修复体常用的固位形有哪些?
- 5 牙周基础治疗的主要内容及生物学基础是什么?
- 6 深龋的治疗原则及治疗方法是什么?
- 7 试比较多囊型成釉细胞瘤和单囊型成釉细胞瘤的临床、病理特点?
- 8 简述颞下颌关节解剖生理特点?