



暨南大学
JINAN UNIVERSITY

2011 年全国硕士研究生统一入学考试自命题试题

学科与专业名称：护理学

考试科目代码与名称：308 护理综合

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

单选题：以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑（共 150 题，每题 2 分）。

1、近代护理学的形成是从

A、16 世纪中叶开始 B、17 世纪中叶开始 C、18 世纪中叶开始 D、19 世纪中叶开始 E、20 世纪中叶开始

2、对前来门诊的患者，首先应进行

A、卫生指导 B、健康教育 C、预检分诊 D、心理安慰 E、查阅病案资料

3、病室的适宜温度为

A、10-15℃ B、15-18℃ C、16-20℃ D、18-24℃ E、26-28℃

4、以下哪项是属于患者的客观资料

A、我的头很疼 B、我咽喉部充血 C、我入睡困难 D、我不想吃饭 E、我感到恶心

5、在临床护理操作中，不符合省力原理的是

A、在协助患者移动体位时，两脚应前后或左右分开，尽量扩大支撑面 B、在进行低平面的护理操作时，双下肢应随身体动作的方向前后或左右分开 C、提取物品时，尽量将物品靠近身体 D、能使用整只手时，避免只用手指进行操作 E、操作时两腿前后分开稍屈膝

6、关于更换卧位，不正确的是

A、先将各种导管安置妥当 B、颈椎牵引者，翻身时先放松牵引 C、翻身时，避免拖、拉、推等动作 D、颅脑手术者，应取健侧卧位或平卧位 E、翻身后注意伤口不可受压

7、关于半坐卧位，正确的是

A、摇起床头 $\geq 60^\circ$ B、适用于面部及颈部手术患者，减少局部出血 C、对于呼吸困难患者，下肢屈膝的目的是为了使回心血量增加 D、对于腹部手术后的患者，采取半卧位可增加腹部切口处的张力 E、盆腔炎患者，可使炎症扩散

- 8、两人搬运患者的正确方法是
A 甲托背部，乙托臀部和膝部 B 甲托头部和肩部，乙托臀部 C 甲托颈部和腰部，乙托大腿和小腿 D 甲托头部和背部，乙托臀部和小腿 E 甲托头颈肩部和腰部，乙托臀部和膝部
- 9、促进患者舒适的护理措施不包括：
A、尊重患者生活方式 B、向患者介绍病室环境及有关规定 C、营造良好的就医环境 D、了解患者的需求 E、放宽探视时间限制，延长陪护时间
- 10、使用约束带时应重点观察的是
A、衬垫是否移位 B、约束部位局部皮肤颜色 C、约束带是否牢靠 D、患者的体位是否合适、舒适 E、患者的神志
- 11、缓解患者不适的首要护理措施为：
A、给患者以心理支持 B、使患者处于舒适体位 C、了解引起不适的原因 D、调整病室环境 E、使用药物缓解症状
- 12、某男性患者，国家重点科研攻关项目负责人，今晨在实验室工作时因“胸部不适”以急性心肌梗塞收入 CCU，并立即给予氧气吸入和心电监护。现神情呈痛苦面容，目前促进该患者舒适的首要护理措施是
A、调整体位 B、缓解疼痛 C、按摩疼痛部位 D、介绍环境 E、心理咨询
- 13、正常人一般不易引起口腔感染，是由于唾液中含有
A、乳糖酶 B、淀粉酶 C、溶菌酶 D、游离酸 E、脂肪酶
- 14、各期褥疮局部处理均可采用
A、创面引流 B、抗生素纱布局部湿敷 C、3%过氧化氢溶液冲洗 D、红外线照射 E 拇指腹对局部环形按摩
- 15、关于深静脉血栓形成，不正确的是
A、静脉血栓形成是静脉冲的一种急性非化脓性炎症 B、病变主要累及四肢浅静脉或下肢深静脉 C、深部静脉血栓形成的原因是静脉血流加速 D、对大手术后患者，应鼓励患者在床上进行下肢的主动活动 E、已有小腿静脉血栓形成时，以防血栓向近心端延伸或脱落
- 16、妊娠时胎膜早破患者应采用的体位是
A、半卧位 B、平卧位 C、侧卧位 D、头低脚高位 E、截石位
- 17、某患者，女性，70 岁，脑梗塞后右上肢可移动，但不能抬起，该患者的右上肢肌力评级为

A、0 级 B、1 级 C、2 级 D、3 级 E、4 级

18、手术器械的最有效灭菌法是

A、燃烧法 B、高压蒸汽灭菌法 C、煮沸消毒法 D、干热灭菌法 E、微波效应灭菌法

19、常用于黏膜及深部伤口冲洗的消毒溶液是

A、0.2%过氧乙酸溶液 B、70%乙醇溶液 C、0.1%氯胺溶液 D、0.5%碘酊 E、0.05%苯扎溴胺溶液

20、取用瓶装的无菌溶液时，正确的操作是

A、应在高出容器 25 厘米处倒出溶液 B、用敷料堵住瓶口，使溶液缓慢流出 C、直接在瓶中蘸取 D、已经打开的瓶内溶液可保存 24 小时 E、倒出的溶液未使用及时倒回瓶中

21、关于发热的叙述，下列哪项是正确的

A 常见的发热类型有 6 种 B 发热必须有致热原的参与 C 外致热原直接作用于体温调节中枢 D 体温上升期有畏寒，退热期有出汗 E 发热时是散热中枢兴奋，退热时是寒颤中枢兴奋

22、健康成人个体差异较大的生命体征是

A、体温 B、脉搏 C、呼吸 D、血压 E、意识状态

23、以下诊脉操作错误的是

A、诊脉前患者保持安静 B、患者手臂伸展放于舒适体位 C、操作者用食指、中指、无名指诊脉 D、测量 30 秒所得脉搏次数乘以 2 即为患者的脉率 E、有脉绌者先听心率，再测脉率，计时 1 分钟

24、测量呼吸的方法，错误的一项是

A、测量前向病人解释以取得合作 B、观察病人胸腹起伏，一起一伏为呼吸一次 C、注意呼吸的深度和节律 D、成人、儿童测量时间可为 30 秒，所得次数乘以 2 即为患者每分钟呼吸频率 E、呼吸异常者测量时间为 1 分钟

25、测量血压时听到搏动声音突然变弱或消失，此时袖带内压力

A、大于心脏收缩压 B、等于心脏收缩压 C、小于心脏收缩压 D、等于心脏舒张压 E、大于心脏舒张压

26、下列哪项不是热的应用目的

A 促进炎症消散或局限 B 减轻深部组织充血 C 接触疼痛 D 制止炎症扩散或化脓 E 保暖

27、冷疗时间过长可致

A、肌肉、肌腱和韧带等组织松弛 B、皮肤抵抗力减低 C、增强痛觉神经的兴奋性 D、增进局

部免疫功能 E、血液循环和细胞代谢发生障碍致组织坏死

28、正确的乙醇拭浴操作是

A、头部放热水袋，足部放冰袋 B、新生儿用乙醇拭浴 C、发生寒战应减慢拭浴速度 D、足底为乙醇拭浴禁忌部位 E、擦拭胸腹部时动作轻柔

29、某男，大学生，尽早锻炼时不慎扭伤踝关节，2 小时后到学校医务室就诊，正确的处理方法是

A、热敷 B、冷敷 C、冷热敷交替使用 D、热水足浴 E、夹板固定

30、下列哪项不符合要素饮食的特点

A、由各种天然营养素合成 B、无需消化液也能被吸收 C、有利于纠正负氮平衡 D、适用于胃肠道痿、急性胰腺炎等患者 E、符合正常生理营养需求

31、鼻饲流质每次注入量不能超过

A、200 毫升 B、300 毫升 C、400 毫升 D、500 毫升 E、600 毫升

32、药物保管原则，下列不正确的是

A、药柜宜放在光线充足处 B、专人保管，定期检查 C、内服药与外用药分类保管 D、麻醉药加锁保管 E、瓶签模糊的药物认真核对后可以使用

33、准备口服药时下列哪项欠妥

A、水剂：勿摇匀以免沉淀物混入 B、片剂：用药勺取用 C、油剂：在杯内加少量水以避免油剂附着在杯上 D、不足 1 毫升的药液需使用滴管吸取 E、配个人专用药物，不可彼此借用

34、少尿是指 24 小时尿量少于

A、50 毫升 B、100 毫升 C、200 毫升 D、300 毫升 E、400 毫升

35、关于带气囊导尿管，正确的是

A、当注入一定量的液体后可将尿管固定在膀胱内 B、便于插管 C、插管见尿后再插入 5cm 即可 D、用于测定残余尿 E、用于鉴定尿闭或尿潴留

36、输液时发生静脉痉挛致滴注不畅时应

A、减慢滴注速度 B、抬高输液瓶 C、加压输液 D、适当更换患者体位 E、局部热敷

37、静脉输液不慎发生空气栓塞，致死的栓塞部位在

A、左房室口 B、右房室口 C、主动脉入口 D、肺动脉入口 E、上腔静脉口

38、关于溶血反应所致的急性肾功能衰竭症状，错误的是

A、少尿或无尿 B、高钾血症 C、酸中毒 D、可出现管型尿和蛋白 E、尿素氮滞留

- 39、护士观察患者瞳孔时，不需记录的项目是
A、双侧瞳孔的大小 B、双侧瞳孔的对称性 C、双侧瞳孔的形状 D、双侧瞳孔的清晰度 E、对光反射情况
- 40、生物死亡期的特征是
A、心跳停止 B、呼吸停止 C、各种反应消失 D、意识不清 E、体温接近室温
- 41、根据咯血量，临床将咯血 $<100\text{ml/d}$ 称为
A. 痰中带血 B. 少量咯血 C. 中等量咯血 D. 大量咯血 E. 大咯血
- 42、有关机械吸痰注意事项中，哪项不合适
A. 每次吸引时间应少于 15 秒 B. 两次抽吸间隔少于 3 分钟 C. 吸痰动作要轻柔 D. 在吸痰前、中、后适当提高吸入氧的浓度 E. 严格无菌操作
43. 某呼吸衰竭病人在应用人工呼吸器和呼吸兴奋剂过程中出现恶心、呕吐、烦躁、颜面潮红、肌肉颤动等现象，应考虑
A. 继发感染 B. 通气量不足 C. 呼吸兴奋剂过量 D. 呼吸性碱中毒 E. 痰液壅塞
44. 某肺结核患者，突然出现喷射性大咳血，继而突然中断，表情恐怖，大汗淋漓，此时首要的护理措施：
A. 立即取半卧位 B. 加压给氧 C. 立即气管插管 D. 保持呼吸道通畅，清除血块 E. 人工呼吸
45. 某慢性阻塞性肺气肿病人，剧烈咳嗽后突然出现右侧剧烈胸痛，呼吸困难加重，右胸叩诊鼓音，应考虑并发症为
A. 慢性肺心病 B. 肺炎 C. 自发性气胸 D. 肺不张 E. 胸膜炎
46. 某肺心病患者，血气分析：动脉血氧分压 6.0kPa (45mmHg)，动脉血二氧化碳分压 10.0kPa (75mmHg)，应给予哪种氧疗法
A. 持续低流量、低浓度给氧 B. 持续高流量、高浓度给氧 C. 间歇低流量、低浓度给氧 D. 间歇高流量、高浓度给氧 E. 间歇高流量、酒精湿化给氧
47. 高血压病患者睡眠时突感极度胸闷，气急，大汗淋漓，咳大量粉红色泡沫痰，端坐呼吸，血压 $26.6 / 14.7\text{kPa}$ ($200 / 110\text{mmHg}$)，心率 110次/min 。下列哪项护理是错误的
A. 安慰患者，稳定情绪 B. 置患者于两腿下垂坐位 C. 酒精湿化吸氧 $4\sim 6\text{L/min}$ D. 建立静脉通路 E. 静脉滴注给药宜快速
48. 长期卧床的慢性心功能不全病人，其水肿的分布特点是

- A. 以踝内侧明显 B. 以胫前部明显 C. 以颜面部明显 D. 以腰背部、骶尾部明显 E. 以四肢明显
49. 接受降压药物治疗的高血压病患者，起床时晕倒，片刻后清醒，首先考虑
- A. 直立性低血压 B. 心源性休克 C. 高血压危象 D. 高血压脑病 E. 急性左心衰竭
50. 某原发性高血压病人，吸烟史 20 年，肥胖，目前血压 21.3 / 12.7 kPa (16 / 95 mmHg)，下列健康教育内容哪项错误
- A. 保持情绪稳定 B. 适量运动 C. 高热量，高糖饮食 D. 戒烟 E. 控制高血压
51. 成人脉压大于 5 kPa 可见于
- A. 甲状腺功能减退 B. 心包积液 C. 严重二尖瓣狭窄 D. 主动脉瓣关闭不全 E. 主动脉瓣狭窄
52. 某风湿性心脏病病人，卧床 4 个月余，每天需作下肢被动活动和按摩，其目的是
- A. 促进末梢循环减少回心血量 B. 防止肢体肌肉萎缩 C. 防止下肢静脉血栓形成 D. 防止足部发生褥疮
- E. 使病人舒适促进睡眠
53. 某急性心肌梗塞患者发病 48h 后，要求到厕所大便，你应该
- A. 嘱家人陪往 B. 肛塞开塞露后，再允许前往 C. 先给予缓泻剂，再允许前往 D. 如无便秘史，应允许前往 E. 坚持制止，指导床上使用便盆
54. 某肝性脑病病人需要灌肠，最适宜的灌肠液为
- A. 肥皂水 B. 生理盐水 C. 高锰酸钾溶液 D. 碳酸氢钠溶液 E. 生理盐水加白醋
55. 某消化性溃疡病人，因上腹疼痛、反酸入院，治疗期间由于饮食不当并发大出血，此时不会出现
- A. 呕吐 B. 黑粪 C. 昏厥 D. 休克 E. 上腹痛加重
56. 上消化道出血患者，血压 10 / 6 kPa (75 / 45 mmHg)，脉搏 130 次 / min，面色苍白，神志恍惚，四肢厥冷，无尿，估计出血量约
- A. 250 mL 以下 B. 250 ~ 300 mL C. 300 ~ 400 mL D. 500 ~ 1000 mL E. 1000 mL 以上
57. 某肝硬化患者经利尿治疗后，腹水消退，但经常处在深睡状态，可被唤醒，醒后回答问题正确，去除刺激后又迅速入睡，应判断为
- A. 谵妄 B. 浅昏迷 C. 昏睡 D. 嗜睡 E. 意识模糊
58. 患者男性，50 岁，肝硬化并上消化道出血，在使用双气囊三腔管压迫止血期间，突然出现躁动、紫绀、呼吸困难，此时应立即
- A. 报告医师 B. 吸氧 C. 应用呼吸兴奋剂 D. 应用镇静剂 E. 放去气囊内气体

59. 有幽门梗阻者行胃镜检查前 2~3 天应给予
A. 流食 B. 半流食 C. 低脂半流食 D. 少渣普食 E. 免奶普食
60. 急性肾炎临床首发症状多为
A. 少尿、无尿 B. 高血压 C. 心力衰竭（全心衰） D. 水肿、血尿 E. 高血压脑病症状
61. 原发肾病综合征常可自发形成血栓原因是
A. 血小板增多 B. 血管内皮易受损 C. 组织因子易释放 D. 血液多凝状态 E. 红细胞增多
62. 急性肾衰少尿或无尿期易引起高血钾症，其危害是
A. 全身水肿 B. 体重增加 C. 高血压 D. 急性左心衰 E. 抑制心肌细胞易致严重心率失常
63. 急性肾衰预防高血钾具体措施哪项是错误的
A. 避免食用含钾多食品如蘑菇、榨菜 B. 不用含钾多的药物如氯化钾 C. 遵医嘱可口服甘露醇，促钾离子排出 D. 禁用库存血 E. 贫血严重可用库存血
64. 慢性肾炎健康教育不正确的是：
A 避免受凉、劳累 B 高蛋白饮食 C 禁用肾毒素药物 D 育龄妇女注意避孕 E 按时测血压，调整降压药量
65. 针对慢性肾功能衰竭病人的潜在感染护理问题，不应采取的护理措施是
A 避免与呼吸道感染者接触 B 减少探陪 C 室内定时消毒 D 每日口服小剂量抗菌药 E 注意保暖
66. 脑出血病人发生脑疝与下列哪项无关
A 用力排便 B 气道阻塞严重缺氧 C 腰穿放液过多 D 脱水剂快速静脉滴注 E 快速大量补液
67. 某下肢瘫痪者，经查肢体不能自行抬起，此肌力应判断为
A. 0 级 B. 1 级 C. 2 级 D. 3 级 E. 4 级
68. 一般脑血栓形患者，早期进行患肢功能锻炼宜在发病后几天进行
A. 3 天 B. 1 周 C. 2 周 D. 3 周 E. 4 周
69. 某脑血管病瘫痪病人，需进行功能锻炼，错误的是
A. 制定功能锻炼计划 B. 尽早进行自主运动锻炼 C. 使用辅助器具 D. 配合按摩理疗 E. 注意做好保护措施
70. 下列瘫痪病人的呼吸道护理，哪项是错误的
A. 痛觉室内空气流通、保暖 B. 鼓励病人尽量咳嗽、排痰 C. 喂食要慢以免呛入气管 D. 注意口腔护理 E. 对分泌物较多而咳嗽无力者应先翻身后吸痰
71. 瘫痪肢体宜保持功能位，下列哪项是错误的

- A. 膝关节伸直 B. 腕关节稍背曲 C. 肘关节屈曲 D. 踝关节垂直 E. 膝关节外置一枕以防外旋
72. 深昏迷是最重要的体征是
- A. 瞳孔反射消失 B. 压眶反射迟钝 C. 病理反射阴性 D. 角膜反射减弱 E. 吞咽反射亢进
73. 某甲状腺功能亢进症病人，体温 39.5°C ，脉搏 $150\text{次}/\text{min}$ ，出现恶心、呕吐、大汗淋漓、嗜睡等症状。初步判断为
- A. 抗甲状腺药物中毒 B. 甲状腺功能低下 C. 甲状腺危象 D. 恶性突眼 E. ^{131}I 治疗反应
74. 1 型糖尿病临床表现特点下列哪项不妥
- A. 多发生于青少年 B. 起病较急 C. 症状重 D. 起病缓慢 E. 常以酮症酸中毒为首发症状
75. 目前糖尿病患者主要死亡原因为
- A. 下肢动脉血栓形成 B. 酮症酸中毒 C. 高渗性非酮症昏迷 D. 冠心病、脑血管疾病 E. 糖尿病性肾病
76. 某急性再生障碍性贫血病人，突然出现头痛、头晕、视力模糊、呕吐，疑为颅内出血，护理措施不正确的是
- A. 通知医生 B. 吸氧 C. 头低脚高位 D. 建立静脉通道 E. 头部置冰袋
77. 系统性红斑狼疮的诱因不包括
- A. 运动 B. 药物 C. 阳光照射 D. 感染 E. 食物
78. 某急性白血病人，乏力、消瘦 1 个月，伴发热 1 周，食欲减退。化疗后有恶心的反应，但无呕吐。测血白细胞计数 $2 \times 10^9/\text{L}$ ($2000/\mu\text{L}$)，血小板计数 $150 \times 10^9/\text{L}$ ($15\text{万}/\mu\text{I}$)。该病人的护理问题可排除下列哪一项
- A. 潜在的感染 B. 营养失调：低于机体需要量 C. 活动无耐力 D. 舒适的改变：发热、恶心 E. 潜在的颅内出血
79. 基础代谢率常用的计算公式是：
- A. 基础代谢率 = (脉率 - 脉压) - 111 B. 基础代谢率 = (脉率 + 脉压) - 111 C. 基础代谢率 = (脉压 - 脉率) + 111 D. 基础代谢率 = (脉率 - 脉压) + 111 E. 基础代谢率 = (脉率 + 脉压) + 111
80. 乳癌的淋巴转移途径中，最多见的是
- A. 经肋间淋巴管侵入胸骨旁淋巴结 B. 经胸大肌外侧淋巴管侵入腋窝淋巴结 C. 经皮下淋巴管侵入另侧乳房 D. 经深部淋巴网侵入腹直肌鞘 E. 经深部淋巴管网侵入肝镰状韧带
81. 恶性肿瘤最多见、最早出现的局部表现是

A、肿块 B、疼痛 C、溃疡 D、破坏所在器官结构 E、淋巴转移

82、腹外疝好发于腹股沟区的主要原因是

A、腹股沟韧带松弛 B、腹外斜肌腱膜发育不良 C、腹股沟区有精索及圆韧带通过 D、腹内斜肌和腹横肌发育不良 E、腹内压增高

83、腹膜炎的主要标志是

A、明显腹胀 B、腹式呼吸减弱或消失 C、肠鸣音消失 D、压痛和反跳痛 E、腹肌紧张

84、对腹部闭合性损伤伴休克，且腹腔穿刺抽出不凝固血液的患者，首先应

A、在治疗休克的同时紧急手术 B、行胃肠减压 C、禁食 D、抗休克 E、先抗休克，然后进行手术

85、诊断为肠梗阻后，极为重要的是必须明确

A 肠梗阻的部位 B 肠梗阻的程度 C 肠梗阻是否绞窄 D 肠梗阻的原因 E 是否完全性肠梗阻

86、急性阑尾炎早期腹痛多位于上腹部和脐周，是因为

A 内脏功能紊乱 B 腹膜炎刺激 C 内脏神经反射 D 胃肠道反射痉挛 E 合并急性胃肠炎

87、直肠癌根治术是否保留肛门，主要决定于

A、肿瘤的病理类型 B、肿瘤的大小 C、肿瘤距肛门的距离 D、肿瘤是否侵犯周围组织 E、乙状结肠的长度

88、急腹症病人阵发性腹痛常见于

A、阑尾炎 B、溃疡病穿孔 C、肝破裂内出血 D、机械性肠梗阻 E、肠绞窄

89、休克经处理后，微循环改善的最重要指标是

A、神志恢复清楚 B、皮肤颜色转红 C、肢端温度上升 D、血压回升 E、尿量增多

90、下肢深静脉功能试验的目的是了解

A、下肢静脉有无曲张 B、大隐静脉瓣膜功能是否正常 C、交通支瓣膜是否正常 D、下肢深静脉有无阻塞 E、小隐静脉瓣膜功能是否正常

91、胸部外伤后，胸壁软化（浮动肋）的发病原因是

A、2 根以上肋骨骨折 B、多根多处肋骨骨折 C、胸骨骨折 D、反常呼吸 E、气胸

92、硬膜外麻醉后需平卧 4-6 小时，其原因是

A、减轻药物吸收后的毒性反应 B、有利于维持血压稳定 C、防止呕吐误吸 D、防止术后头痛 E、有利于保持呼吸道通畅

93、手术人员穿好无菌手术衣、戴好无菌手套后，双手应放在

A、交叉腋下 B、腰部 C、胸前 D、身体两侧 E、高举双手

94、浅Ⅱ°烧伤的临床特点是

A、局部红肿，有疼痛和烧灼感，皮温稍增高 B、水泡较饱满，有剧痛和感觉过敏，皮温增高 C、水泡较小，感觉稍迟钝，皮温稍低 D、水泡扁平，感觉稍迟钝，皮温稍低 E、创面无水泡，感觉消失，皮温低

95、某病人从高处跌下致骨盆骨折、左肱骨开放性骨折，伤口正在大量出血，首先应采取的措施是

A、骨折复位并固定 B、清创缝合 C、输血输液 D、包扎伤口止血 E、骨折复位

96、截瘫病人留置导尿管定时开放引流，其目的是

A、预防结石 B、预防泌尿道感染 C、训练膀胱功能 D、计尿量 E、便于护理

97、抢救颅内压增高时首选

A、腰椎穿刺 B、激素 C、脱水剂 D、镇痛 E、止吐

98、单纯颅底骨折的临床表现哪项除外

A、脑脊液漏 B、偏瘫 C、熊猫眼征 D、上眼睑下垂 E、乳突区淤斑

99、对颅脑损伤病人测量生命体征的顺序应该是

A、呼吸>脉搏>血压>意识 B、脉搏>呼吸>血压>意识 C、意识>呼吸>脉搏>血压 D、意识>脉搏>呼吸>血压 E、呼吸>意识>脉搏>血压

100、腰椎间盘突出症最重要的体征是

A、椎间隙压痛 B、椎旁压痛 C、直腿抬高试验(+) D、直腿抬高试验(+), 加强试验(+) E、腰椎侧突畸形

101、有关肠外营养支持的描述正确的是

A、价格低廉，使用方便 B、减少消化液分泌，利于肠道休息 C、有利于保持肠粘膜的屏障功能 D、符合人体摄取营养的生理过程 E、脂肪是肠外营养时主要的非蛋白质能源

102、以下与低钾血症表现不符的是

A、肌肉无力 B、腹胀 C、心率缓慢 D、心室纤颤 E、心电图出现U波

103、下列全身化脓性感染的治疗中，错误的是

A、及时处理原发病灶，去除坏死组织，及时切开脓肿进行引流 B、提高全身的抵抗力 C、使用足量抗生素 D、因有接触性感染，因此接触后要洗手 E、对症处理，降温，抗休克治疗

104、治疗急性梗阻性化脓性胆管炎的关键是

- A、使用抗生素 B、使用升压药 C、扩充血容量 D、解除胆道梗阻 E、解热、镇痛
- 105、胃十二指肠溃疡穿孔最重要的诊断依据是
- A 上腹部剧烈疼痛 B X 线检查见膈下游离气体 C 腹肌紧张 D 恶心、呕吐 E 肠鸣音减弱
- 106、前列腺切除术后的护理重点是
- A、观察和防治出血 B、防止感染 C、防止尿道狭窄 D、防止血栓形成 E、防止尿失禁
- 107、肾损伤患者进行非手术治疗的护理措施叙述不正确的是
- A. 应绝对卧床休息 2~4 周 B. 血尿消失，可以允许患者适当下床活动 C. 对于高热者可以物理或药物降温 D. 若腰腹部肿块逐渐增大，说明有进行性出血或尿外渗 E. 腰腹部疼痛明显者，可给予止痛、镇静剂
- 108、8 岁男孩在排尿中途突然尿流中断，呼痛不已，应首先考虑
- A、尿道结石 B、膀胱结石 C、肾结石 D、输尿管结石 E、肾盂结石
- 109、下列关于肾癌病人叙述正确的是
- A、血尿为间歇性、无痛性镜下全血尿 B、可有高血压、红血球增高等表现 C、比膀胱癌少见且发展较慢 D、X 线检查重要，但 B 超检查无意义 E、腰部疼痛剧烈
- 110、预防术后肺不张的措施，下列哪项无效
- A. 术前锻炼深呼吸 B. 吸烟者术前戒烟 C. 抗生素控制上呼吸道感染 D. 镇咳剂止咳 E. 防止术后误吸呕吐物
- 111、胆道病人的饮食宜给
- A. 低脂、高糖饮食； B. 高脂、低糖饮食； C. 低脂、低糖饮食； D. 低糖饮食，补充维生素 B、C、K； E. 低脂饮食
- 112、前列腺增生排尿障碍是由于
- A、后尿道形态改变尿道梗阻 B、膀胱收缩无力 C、尿道粘膜水肿 D、尿道括约肌痉挛 E、膀胱颈梗阻
- 113、后尿道断裂术后的导尿管应保留
- A、1 周 B、2 周 C、3~4 周 D、5 周 E、6 周
- 114、代谢性酸中毒的主要原因是
- A、碳酸氢盐过多 B、碳酸氢盐缺乏 C、二氧化碳过多 D、二氧化碳缺乏 E、以上都不正确
- 115、关节受外力作用，发生异常扭转所致的损伤为
- A、挫伤 B、挤压伤 C、扭伤 D、裂伤 E、擦伤

116、建筑工人, 42 岁, 右上臂被砖块击伤 1 小时。体查: 右上臂肿胀, 异常活动, 腕及掌指关节不能背伸, 拇指不能背伸。可能是损伤了

A、肱动脉 B、桡神经 C、正中神经 D、尺神经 E、桡动脉

117、骨折移位的发生因素有

A. 暴力的大小、作用方向及性质 B. 肌牵拉力 C. 肢体远侧段的重量 D. 搬运及治疗不当 E 各种因素都可存在

118、下列哪类病人术后应早期起床活动

A 疝修补术 B 晚期胃癌姑息手术 C 脾破裂切除术 D 大隐静脉结扎术 E 门静高压断流术

119、输卵管由内向外部依次为

A. 峡部、间质部、壶腹部、伞部 B. 峡部、壶腹部、间质部、伞部 C. 间质部、峡部、壶腹部、伞部 D. 间质部、峡部、伞部、壶腹部 E. 伞部、壶腹部、峡部、间质部

120、初孕妇初感胎动时间一般在

A. 14-16 周 B. 16-18 周 C. 18-20 周 D. 20-22 周 E. 22-24 周

121、Apgar 评分所评定的内容为

A. 呼吸、心率、脉搏、哭声、肌张力 B. 呼吸、心率、皮肤颜色、喉反射、肌张力 C. 呼吸、心率、皮肤颜色、哭声、肌张力 D. 呼吸、心率、脉搏、喉反射、肌张力 E. 呼吸、体温、心率、哭声、肌张力

122、初乳的特点, 错误的是

A. 初乳中脂肪和乳糖含量较成熟乳多 B. 初乳含 β -胡萝卜素是淡黄色质稠 C. 含分泌型 IgA, 较成熟乳多 D. 初乳是指产后 7 日内分泌的乳汁 E. 初乳中含蛋白质较成熟乳多

123、行胎心监护时, 为判断基线胎心率, 监护时间至少应为

A. 6 分钟 B. 8 分钟 C. 10 分钟 D. 12 分钟 E. 14 分钟

124、妊娠高血压综合症, 用大剂量硫酸镁治疗, 最早出现的中毒反应是

A. 呼吸加快 B. 呼吸减慢 C. 尿量增多 D. 膝腱反射亢进 E. 膝腱反射减弱

125、判断妊娠期糖尿病的依据是

A. 尿糖 B. 尿酮体 C. 血糖 D. 50 克葡萄糖耐量试验 E. 75 克葡萄糖耐量试验

126、急产是指总产程少于

A 1 小时 B. 2 小时 C. 3 小时 D. 4 小时 E. 5 小时

127、产后抑郁常见于

A. 产后 24 小时内 B. 产后 72 小时内 C. 产后 7 天内 D. 产后 2 周 E. 产后 4 周

128、末次月经缩写为

A. PMP B. LMP C. GMP D. PML E. GPT

129、子宫颈癌根治术后，可以拔除尿管的时间是术后

A. 1-2 天 B. 3-4 天 C. 5-6 天 D. 7-14 天 E. 2 周以后

130、子宫脱垂是指子宫颈外口达

A. 坐骨结节水平以上 B. 坐骨结节水平以下 C. 坐骨棘水平以上 D. 坐骨棘水平以下 E. 骶尾骨以下

131、导致子宫脱垂的最主要原因是

A. 圆韧带松弛 B. 阔韧带变厚 C. 骨盆漏斗韧带松弛 D. 宫颈横韧带松弛 E. 盆底肌肉松弛

132、产后出血，最常见的原因是

A. 宫缩乏力 B. 胎盘胎膜产留 C. 胎盘植入 D. 软产道损伤 E. 凝血功能障碍

133、原发性不孕症的定义是

A. 夫妇同居，性生活正常，未避孕，2 年未孕者 B. 夫妇同居，性生活正常，未避孕，1 年未孕者 C. 夫妇同居，性生活正常，虽第一次婚姻曾生育，此后未避孕，2 年未孕者 D. 夫妇同居，性生活正常，虽第一次婚姻曾生育，此后未避孕，1 年未孕者 E. 夫妇同居后 1 年未孕，一方有无法纠正的解剖生理缺陷者

134、判断脱水性质最常用的检查指标是

A. 体重 B. 尿量 C. 皮肤弹性 D. 血清钠 E. 二氧化碳结合力

135、小儿腹泻轻度脱水，丢失水分约占体重的

A. 3%-5% B. 5%-6% C. 7%-8% D. 9%-10% E. 10%-12%

136、重症肺炎患儿面罩给氧时，吸氧浓度最好为

A. 10%-20% B. 20%-30% C. 30%-40% D. 40%-50% E. 50%-60%

137、法洛四联症患儿蹲踞所起的作用是

A 心脑供血量增加 B 缓解漏斗部痉挛 C 腔静脉回心血量增加 D 休息，缓解疲劳 E 减少右向左分流血量

138、生理性贫血最明显的年龄是

A. 1 个月以内 B. 2-3 个月 C. 5-6 个月 D. 8-9 个月 E. 11-12 个月

139、肾病综合征患儿最常见的并发症是

A. 感染 B. 血栓形成 C. 电解质紊乱 D. 急性肾衰竭 E. 低血容量性休克

140、典型麻疹皮疹特点

A. 鲜红色粟粒疹 B. 疹间无正常皮肤 C. 出血性斑丘疹 D. 暗紫色斑丘疹 E. 红色斑丘疹

141、婴儿每日水的需要量为

A. 120ml/kg B. 130ml/kg C. 140ml/kg D. 150ml/kg E. 160ml/kg

142、中度贫血的标准是 Hb

A. >120g/L B. 90-120g/L C. 60-90g/L D. 30-60g/L E. <30g/L

143、小儿患水痘后重返托幼机构的要求是

A. 体温正常 B. 食欲好转 C. 皮疹消退 D. 全部皮疹干燥结痂 E. 不再出现新的皮疹

144、患儿生后 8 小时，有高胆红素血症需用蓝光照射，照射过程中，灯管距患儿皮肤距离为

A. 10-20cm B. 22-32cm C. 33-50cm D. 55-60cm E. 60-65cm

145、维生素 D 缺乏的患儿发生手足抽搐的主要原因是

A. 饮食中缺钙 B. 甲状旁腺反应迟钝 C. 尿磷增加 D. 尿钙增加 E. 骨骼钙化增加

146、鹅口疮患儿用碳酸氢钠溶液清洗口腔，常用的浓度为

A. 2% B. 2.5% C. 3% D. 3.5% E. 5%

147、某系统性红斑狼疮女患者，病史 2 年，近日体温升高，关节红肿有压痛，出现面部红斑、蛋白尿而入院治疗，下列处理哪项不妥

A. 维持激素治疗 B. 安排在背阳的病室 C. 加强肢体锻炼 D. 慎用阿司匹林 E. 经常用清水洗脸

148、胰岛素生理功能是

A. 促糖原分解和糖异生，使血糖降低 B. 促葡萄糖利用和转化，使血糖降低，促蛋白质合成
C. 促蛋白质合成，维持男性第二性征 D. 调节胃肠平滑肌运动 E. 刺激骨髓红细胞生成

149、糖尿病患者体内葡萄糖不能被充分利用，发生消瘦的原因是

A. 口渴多饮 B. 脂肪合成增多 C. 无氧糖酵解增加 D. 蛋白质和脂肪分解增多及失水 E. 促进肌肉组织摄取葡萄糖

150、羊水过多的定义是指妊娠的任何时期羊水量超过

A. 800ml B. 1000ml C. 1200ml D. 1500ml E. 2000ml