

中山大学

二 00 六 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 376

科目名称: 护理综合

考试时间: 1 月 15 日 上午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上,

答在试题纸上的不得分! 请用

蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。

答题要写清题号, 不必抄题。

一. 单项选择题 (共 60 题, 每题 1 分, 共 60 分)

答题说明: 下列的每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最合适的答案, 写在答题纸上。

1. 关于糖尿病足的预防, 下列哪项是最基本的措施:

- A. 注意足部保暖
- B. 保持足部皮肤的清洁
- C. 注意足部动脉搏动的检查
- D. 尽早而有效地控制血糖
- E. 避免足部皮肤的人为性损伤

2. 糖尿病最基本的治疗方法是:

- A. 饮食控制
- B. 运动疗法
- C. 血糖自我监测
- D. 降糖药和 (或) 胰岛素的应用
- E. 病人及其家属的健康教育

3. 肺炎球菌肺炎与金黄色葡萄球菌肺炎最大的区别点在于:

- A. 有无明显的全身中毒症状
- B. 有无明显的肺实变体征
- C. 有无中毒性休克
- D. 血象中有无 WBC 总数的增加或出现核左移
- E. 胸片显示有无肺组织的破坏或空洞的形成

4. 结核病最主要的传染源来自于:

- A. 原发型肺结核
- B. 浸润型肺结核
- C. 急性血行播散型肺结核
- D. 慢性纤维空洞型肺结核
- E. 亚急性血行播散型肺结核

5. 一个因支气管哮喘严重发作而入院的病人, 下列哪项处理是错误的:

- A. 给病人采取半坐卧位
- B. 持续低流量、低浓度吸氧
- C. 减少水分摄入量, 以防气道内分泌物增加
- D. 密切观察呼吸的频率、节律和紫绀的情况
- E. 遵医嘱监测血气的变化

6. 关于慢性支气管炎的叙述, 下列哪项是错误的:

- A. 慢性咳嗽、咳痰是其最主要的表现
- B. 出现发热、脓痰是合并感染的表现
- C. 阻塞性肺气肿是其重要并发症之一
- D. 所有病人均应给予抗菌素治疗
- E. 吸烟是促发因素之一

7. 下列哪项不是自发性气胸病人的体征:

- A. 气管向健侧移位
- B. 气管向患侧移位
- C. 患侧叩诊呈鼓音
- D. 患侧胸廓呼吸运动减弱
- E. 患侧呼吸音减弱或消失

8. 有心脏器质性病变的患者, 最常在哪种情况下诱发心力衰竭:

- A. 快速型心律失常
- B. 情绪激动
- C. 劳累过度
- D. 呼吸道感染
- E. 水、钠入量过多

9. 正常人理想的血压水平为:

- A. $<120/80\text{mmHg}$
- B. $<130/80\text{mmHg}$
- C. $<125/85\text{mmHg}$
- D. $<135/85\text{mmHg}$
- E. $<140/90\text{mmHg}$

10. 在给有需要的病人发放洋地黄时, 应常规测量病人的:

- A. 体温
- B. 血压
- C. 呼吸
- D. 脉搏
- E. 尿量

11. 某心脏病患者, 床上排便后突发严重呼吸困难, R36 次/分, 烦躁不安, 频咳, 并咳出粉红色泡沫样痰, 双肺可闻弥漫性干、湿性啰音, 作为在场护士首选的措施是:

- A. 立即报告值班或主管医生
- B. 立即进行心理护理
- C. 立即协助病人采取半坐卧位或端坐位
- D. 立即建立静脉通道
- E. 立即给予高压、高流量、酒精湿化吸氧

12. 男性患者, 63 岁, 突发胸骨后压榨样疼痛 2 小时, 可向左肩背部放射, 伴呕吐、冷汗。即查 T 38°C , P 110 次/分, R 24 次/分, BP $110/60\text{mmHg}$ 。痛苦面容。ECG 示多个胸导联出现 S-T 段呈弓背向上抬高, 频发室性期前收缩。对该病人首要执行的医嘱是:

- A. 肌注吗啡
- B. 静脉推注利多卡因
- C. 肌注安定
- D. 吸氧
- E. 静脉注射硝酸甘油

13. 病人, 男, 62 岁。有冠心病史。自觉心悸、气促一周前来就诊。体查时发现: P 90 次/分, 不整; 双肺可闻少量湿性啰音。HR 116 次/分, 律不整。此病人最大的可能是并发了:

- A. 哮喘发作
- B. 心力衰竭
- C. 心绞痛
- D. 心房颤动
- E. 肺部感染

14. 导致消化性溃疡易于复发或难以治愈, 最主要的原因是:

- A. 粗糙食物的损害作用
- B. 幽门螺杆菌的感染
- C. 胃酸与胃蛋白酶的自我消化作用
- D. 神经精神因素的长期作用
- E. 药物影响

15. 肝硬化失代偿期最特殊的临床表现是:

- A. 消瘦、乏力
- B. 食欲下降
- C. 脾大

- D. 食管下段-胃底静脉曲张
- E. 腹水

16. 在急性胰腺炎的治疗中, 减少胰液分泌的措施不包括:

- A. 禁食
- B. 胃肠减压
- C. 注射阿托品

- D. 静脉注射奥曲肽
- E. 静脉注射环丙沙星

17. 肾病综合征最重要的两项诊断标准是:

- A. 大量蛋白尿 ($>3.5\text{g/d}$) 和明显水肿
- B. 明显水肿和低蛋白血症 ($<30\text{g/L}$)
- C. 大量蛋白尿 ($>3.5\text{g/d}$) 和低蛋白血症 ($<30\text{g/L}$)

- D. 高脂血症和明显水肿
- E. 高脂血症和大量蛋白尿

18. 关于尿毒症病人临床表现的表述, 下列哪项是错误的:

- A. 消化系统的表现最早出现
- B. 贫血是常有的表现
- C. 代谢性酸中毒是必有表现

- D. 继发性甲旁亢与高血磷、低血钙有关
- E. 水肿是必有表现

19. 关于尿路感染的预防, 下列哪项措施是错误的:

- A. 注意保持会阴部的清洁、干燥
- B. 忌盆浴, 宜淋浴
- C. 低盐饮食

- D. 加强锻炼, 增强体质
- E. 必要时可预防性用药

20. 对称性小关节肿痛伴晨僵, 是下列哪种疾病的主要表现:

- A. SLE
- B. 风湿热
- C. 强直性脊柱炎

- D. 类风湿性关节炎
- E. 痛风

21. 治疗重度低渗性脱水的病人, 首先应输入的液体是:

- A. 5%葡萄糖溶液
- B. 5%葡萄糖盐水
- C. 平衡盐溶液

- D. 复方氯化钠溶液
- E. 3%氯化钠溶液

22. 一溃疡病合并幽门梗阻者, 反复呕吐半个月, 应考虑合并:

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 代谢性酸中毒并呼吸性酸中毒

- D. 呼吸性酸中毒
- E. 呼吸性碱中毒

23. 李某, 腹部手术4天后, 病人体温再次升高, 伤口波动性疼痛, 首先要考虑:

- A. 肺部感染
- B. 盆腔脓肿
- C. 肠粘连

- D. 切口感染
- E. 腹腔脓肿

24. 某成人烧伤病人, 体重 50kg, I 度烧伤 10%, II 度烧伤 40%, III 度烧伤 20%。烧伤后其第一个 24 小时补液总量为:

- A. 8000ml
- B. 7250ml
- C. 4500ml
- D. 6500ml
- E. 5000ml

25. 急性乳房炎早期治疗错误的是:

- A. 切开引流
- B. 局部热敷
- C. 局部理疗
- D. 停止哺乳
- E. 吸尽乳汁

26. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是:

- A. 腹痛性质不同
- B. 有无全身感染征象
- C. 感染的细菌不同
- D. 有无腹膜刺激征
- E. 腹腔有无原发病灶

27. 刘某, 因工伤造成腹部开放性损伤, 有肠管脱出, 现场处理原则:

- A. 立即向腹腔还纳
- B. 等渗盐水冲洗后敷料包扎
- C. 清洁器皿覆盖后再包扎
- D. 及早行清创术
- E. 用无菌溶液冲洗后送回腹腔

28. 毕 II 式胃大部分切除术后近期最严重的并发症是:

- A. 吻合口出血
- B. 残胃蠕动无力
- C. 倾倒综合征
- D. 十二指肠残端破裂
- E. 吻合口梗阻

29. 下列经皮肝胆道造影 (PTC) 的描述, 错误的是:

- A. 可能会发生胆汁漏、出血等并发症
- B. 碘过敏者不能做 PTC
- C. PTC 是一项损伤性检查技术
- D. 嘱病人在穿刺过程中憋气或做深呼吸
- E. 出凝血时间异常者不能做 PTC

30. 王某, 男性, 25 岁, 股骨骨折, 入院行骨牵引, 可维持对抗牵引力的是:

- A. 牵引绳保持在滑槽内
- B. 牵引重量不接触物体
- C. 床尾抬高 15~30cm
- D. 被毯压迫牵引绳
- E. 牵引肢体的足部抵住床栏

31. 下肢静脉曲张术前护理方法中不正确的是:

- A. 建议病人用绷带或弹力袜
- B. 保持大便通畅
- C. 卧床时抬高患肢
- D. 坐时双膝勿交叉过久
- E. 建议病人选择负重运动锻炼肌力

32. 患者, 女性, 35 岁, 长期便秘, 近两个月来排便时及排便后剧烈疼痛, 粪便表面带少量出血, 最可能的诊断是:

- A. 肛门周围脓肿
- B. 一期内痔
- C. 二期内痔
- D. 血栓性外痔
- E. 肛裂

33. 不同原因肠梗阻的共同表现是:

- A. 腹痛、腹胀、呕吐、停止排气排便
- B. 腹痛、腹胀、呕吐、蠕动波
- C. 腹痛、腹胀、呕吐、肠鸣音亢进
- D. 腹痛、腹胀、呕吐、肠型
- E. 腹痛、便秘、呕吐、肠鸣音亢进

34. 临床上用 20% 的甘露醇降低颅内压, 正确的使用方法是:

- A. 快速静推
- B. 15~30 分钟内静滴完 250ml, 1 次/天
- C. 15~30 分钟内静滴完 250ml, 2~4 次/天
- D. 1~2 小时内静滴完 250ml, 2~4 次/天
- E. 缓慢静滴, 防止高渗溶液产生静脉炎

35. 关于颅底骨折的处理, 下列错误的是:

- A. 预防感染
- B. 鼻腔出血时予填塞止血
- C. 长期脑脊液漏并反复出现颅内感染者可考虑手术治疗
- D. 抬高头位
- E. 骨折片压迫视神经, 应尽早手术减压

36. 王先生, 驾车时因急刹车受伤, 造成多根多处肋骨骨折, 急救方法是:

- A. 立即吸氧, 止痛
- B. 应用胸腔闭式引流
- C. 加压包扎固定胸部
- D. 肋骨牵引固定
- E. 注射破伤风抗毒素

37. 胸腔引流管若从患者胸壁伤口脱出, 护士应立即:

- A. 用手捏紧引流管
- B. 将引流管立即插回皮肤
- C. 用手捏紧放置引流管处的皮肤
- D. 更换引流管
- E. 嘱病人暂停呼吸

38. 女, 60 岁, 走路不慎滑倒, 右臀部着地, 对判断是否有骨折最有诊断性意义的是:

- A. 患髋疼痛, 活动时加重
- B. 患肢呈外旋畸形
- C. 走路跛行
- D. 患髋肿胀青紫
- E. 大转子及其周围均有压痛

39. 男, 70 岁, 排尿犹豫, 夜尿增多, 与家人饮烈性酒后, 小便不能自解, 体检发现膀胱区明显膨隆, 最可能的诊断是:

- A. 尿道结石
- B. 膀胱结石
- C. 前列腺增生
- D. 尿道狭窄
- E. 肾衰

40. 患儿, 10 个月, 近两日来出现腹部绞痛、呕吐和便血, 并扪及腹部包块, 最可能的诊断是:

- A. 先天性幽门肥厚
- B. 肠套叠
- C. 阑尾脓肿
- D. 肠蛔虫症
- E. 先天性巨结肠

41. 某女, 25 岁, 未婚有同居史, 停经 14 周, 因恶心、呕吐来院就诊, 尿妊娠试验检查结果为阳性, 要求终止妊娠, 宜选用:

- A. 负压吸引术
- B. 钳刮术
- C. 水囊引产
- D. 利凡诺引产
- E. 药物流产

42. 关于正常产褥期子宫复旧的描述, 下列正确的是:

- A. 产后 30 天, 子宫体完全恢复正常大小
- B. 产后 4 周时宫颈完全恢复正常状态
- C. 产后勤一周, 子宫于腹部不可扪及
- D. 产后宫底每日下降 3 厘米
- E. 子宫肌细胞数目的减少导致子宫缩复

43. 某初产妇, 目前因乳头皲裂而影响母乳喂养, 护士应对其进行下述哪项指导:

- A. 先在损伤较重的一侧乳房哺乳
- B. 减少喂哺的次数
- C. 延长每次喂哺的时间
- D. 哺乳前用毛巾和肥皂水清洁乳头和乳晕
- E. 喂哺后, 挤出少许乳汁涂于乳头和乳晕

44. 关于妊娠合并病毒性肝炎的处理, 下列错误的是:

- A. 产后不宜哺乳
- B. 新生儿必须隔离
- C. 应预防感染
- D. 产时应常规选用对肝脏无害的抗生素
- E. 可选用雌激素退奶

45. 关于胎膜早破, 下列错误的是:

- A. 可由孕期下生殖道感染引起
- B. 阴道液酸碱度检查呈酸性
- C. 胎先露未衔接者应绝对卧床休息
- D. 如有脐带脱垂应尽快结束分娩
- E. 应给予抗生素预防感染

46. 某初产妇, 妊娠足月临产 10 小时, ROA, 胎心 136 次/分, 宫口开大 4cm, 2 小时后再次肛查宫口扩张无进展, 该病人最可能的诊断是:

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 活跃期停滞
- D. 第二产程延长
- E. 第二产程停滞

47. 某产妇, 妊娠足月阴道分娩, 胎盘 30 分钟未娩出, 检查子宫下段有一狭窄环, 此时应采用的适当方法是:

- A. 按摩宫底帮助胎盘娩出
- B. 肌注镇痛剂徒手取胎盘
- C. 麻醉下手取胎盘
- D. 大号刮匙刮取胎盘
- E. 行子宫切除术

48. 下列哪种产褥感染严重时可形成“股白肿”:

- A. 急性子宫内膜炎
- B. 急性子宫肌炎
- C. 急性输卵管炎
- D. 急性盆腔腹膜炎
- E. 血栓性静脉炎

49. 关于宫内节育器的放置时间, 下列哪项是正确的:

- A. 月经干净后 3~7 天
- B. 产后满 2 个月
- C. 剖宫产术后 3 个月
- D. 人工流产术中
- E. 哺乳期月经未复潮

50. 正常妊娠时, 绒毛膜促性腺激素 (HCG) 血清浓度达最高峰为妊娠期的:

- A. 6~9 周
- B. 8~12 周
- C. 8~10 周
- D. 8~14 周
- E. 12~14 周

51. 某 10 个月的小儿, 其每日膳食中各种营养素热能的分配应为:
- A. 蛋白质 25%, 脂肪 35%, 碳水化合物 40% D. 蛋白质 35%, 脂肪 25%, 碳水化合物 40%
- B. 蛋白质 15%, 脂肪 35%, 碳水化合物 50% E. 蛋白质 35%, 脂肪 15%, 碳水化合物 50%
- C. 蛋白质 20%, 脂肪 35%, 碳水化合物 45%
52. 新生儿生理性黄疸的特点, 下列哪项不正确:
- A. 生后 2~3 天出现 D. 一般状况好
- B. 生后 4~5 天最明显 E. 足月儿黄疸持续时间不超过 2 周
- C. 血清结合胆红素 $>26 \mu\text{mol/L}$
53. 患儿在口服铁剂时, 正确的做法是:
- A. 在两餐间服用铁剂 D. 不可与维生素 C 同服
- B. 饭前服用以利吸收 E. 出现大便黑色应停药
- C. 首剂加量以增加药物血浓度
54. 小儿重度脱水, 丢失水分约为体重的:
- A. $<5\%$ D. $>15\%$
- B. $5\% \sim 10\%$ E. $>20\%$
- C. $>10\%$
55. 以下哪项是法洛四联症中最重要的畸形:
- A. 肺动脉狭窄 D. 左心房肥厚
- B. 主动脉骑跨 E. 室间隔缺损
- C. 右心室肥厚
56. 某男孩, 7 岁, 因晨起双睑水肿、血尿, 后伴头痛、水肿加重就诊。尿液检查: 蛋白++, 红细胞 20 个/Hp。处理方法应是:
- A. 给镇痛药缓解疼痛 D. 低盐、高糖、高蛋白饮食
- B. 适当下床活动, 防止血栓形成 E. 无盐、高糖、低蛋白饮食
- C. 应用青霉素控制感染
57. 结核性脑膜炎进入晚期的特征是:
- A. 偏瘫 D. 脑膜刺激征
- B. 腹壁反射消失 E. 昏迷、半昏迷或强直性惊厥频繁发作
- C. 颅神经受损
58. 某新生儿, 胎龄 36 周, 出生体重 2.6kg, 身长 49cm, 肩背部有胎毛, 头发细软, 分条清, 可触及乳头结节, 足底前 2/3 有足纹, 该新生儿应为:
- A. 足月小样儿 D. 早产儿
- B. 足月儿 E. 低出生体重儿
- C. 过渡足月儿
59. 维生素 D 缺乏性佝偻病激期的主要表现是:
- A. 多汗、夜惊 D. 骨骼改变
- B. 枕秃 E. 血钙明显降低
- C. 神经、精神症状

60. 小儿缺铁性贫血最主要的病因是:

- A. 铁摄入不足
- B. 生长发育快
- C. 先天储铁不足
- D. 铁吸收不良
- E. 铁丢失过多

二. 问答题 (共 6 题, 每题 15 分, 共 90 分)

1. 病人男, 64 岁。反复咳嗽、咳痰 15 年, 伴呼吸困难 3 年, 症状加重三天。咳黄痰; 并出现搏动性头痛, 尤以夜间更为明显, 严重影响睡眠, 但日间则呈昏昏入睡状。体查: 嗜睡状态; 球结膜充血水肿; 口唇发绀; 皮肤湿暖; 双肺广泛性干、湿性啰音。血气分析结果: PaO_2 60mmHg; PaCO_2 70mmHg。

- (1) 目前该病人主要出现了何种并发症?
- (2) 哪些症状和 (或) 体征, 提示该病人存在着二氧化碳潴留?
- (3) 目前该病人的氧疗原则及其治疗的关键是什么?

2. 病人男, 32 岁。慢性、周期性上腹痛 3 年, 症状加重 2 天。以空腹时疼痛较为明显。3 小时前突然呕出咖啡样胃内容物约 350ml, 并排出暗红色糊状便约 500ml。体查: P112 次/分; BP90/60mmHg; 神疲乏力, 面色苍白; 腹平软, 上腹脐上偏右有局限性压痛; 肝脾未及; 肠鸣音活跃。

- (1) 导致病人出血的病因可能是什么?
- (2) 目前病人最有效的治疗措施是什么? 护士应如何配合?
- (3) 哪些指征有助于你判断该病人有无继续出血?

3. 患者, 女性, 45 岁, 因大便次数增多, 肛门坠胀感, 血便, 黏液便 3 个月就诊, 活组织检查示: “直肠低分化腺癌”, 入院行 Miles 手术。

- (1) 术前肠道准备的目的?
- (2) 结肠造口的护理?

4. 患者, 男性, 50 岁, 半年前出现干咳、痰中带血丝, 在当地医院予抗感染、止咳治疗, 效果不佳。近 2 周出现胸痛, 咳嗽时加重来就诊。平时嗜烟酒 (烟 2 包/天, 酒 5 两/天)。近两个月来, 食欲下降, 浑身无力, 体重下降近 10 斤, 大小便正常。查体发现有锁骨上淋巴结肿大。

- (1) 患者最可能的医疗诊断是什么?
- (2) 如何对该患者做手术前指导?

5. 某妇女, 30 岁, 结婚 3 年未孕, 长期月经周期紊乱, 经期长短不一, 出血量时多时少。妇科检查: 子宫正常大小, 附件 (一), 结合该妇女情况请回答:

- (1) 最可能的医疗诊断。
- (2) 为确诊应作哪些辅助检查。
- (3) 如选用性激素进行治疗, 应对病人进行哪些健康指导。

6. 1 岁半女孩, 因“发热咳嗽 3 天, 加重伴气喘 1 天”收入院。面色苍白, 口唇发绀, 呼吸促。查体: T 38.7℃, P 182 次/分, R 65 次/分。鼻扇 (+), 三凹征 (+), 双肺呼吸音减低, 可闻及细小湿啰音; 心音低钝, 未闻及杂音; 肝脏右肋下 3cm, 质地软。其余无异常。

- (1) 写出该患儿的医疗诊断。
- (2) 写出该患儿的主要护理措施。