

中山大学

二〇一二年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 308

科目名称: 护理综合

考试时间: 1月8日上午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上, 答在试题纸上的不计分! 请用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要写清题号, 不必抄题。

一. 单项选择题(下列的每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最合适的答案, 写在答题纸上。共 90 题, 每题 2 分, 共 180 分)

单项选择题答题导引: 请严格按照以下格式(10 小题一行), 把选项列在相应的题号后写在答题纸上。并注意字迹清晰。

1. ;2. ;3. ;4. ;5. ;6. ;7. ;8. ;9. ;10. ;
11. ;12. ;13. ;14. ;15. ;16. ;17. ;18. ;19. ;20. ;
.....

1. 护士素质培养的核心是:

A. 职业道德 B. 身体素质 C. 心理素质 D. 专业素质 E. 临床技能

2. 以下哪项护理工作因为“人应该对自己的健康负责”这一观点而更应受重视:

A. 身体护理 B. 心理支持 C. 护理伦理 D. 关怀照顾 E. 健康教育

3. 在 Neuman 系统保健模式中, 从其三级预防的观点出发, 给服务对象进行健康教育的工作落在:

A. 初级预防 B. 二级预防 C. 三级预防 D. 以上三种预防 E. 初级预防和三级预防

4. 以“护士教会服务对象做什么”为特征的护患关系模式是:

A. 主动-被动型 B. 指导-合作型 C. 协助-指引型 D. 评估-反馈型 E. 共同参与型

5. 为不舒适的患者提供护理时, 首先应:

A. 嘱其卧床休息 B. 建立良好护患关系 C. 查明其不舒适的原因
D. 提供舒适的环境 E. 采取有效的措施

(此病例为 6~7 题共用) 患者, 陈某, 男, 60 岁。因癌症化疗后出现口腔溃疡。

6. 护士为其进行口腔护理前首先应:

A. 解释操作目的 B. 准备操作物 C. 评估患者病情 D. 选择漱口溶液 E. 安置患者体位

7. 帮助该患者应对压力的最主要方法是:

A. 提供舒适的住院环境 B. 全面提供生活护理 C. 进行呼吸放松训练
D. 讲解口腔溃疡知识 E. 组织病友联谊会

8. 胃大部分切除术后患者取半坐卧位的最主要目的是:

A. 预防腹膜粘连 B. 改善局部血供 C. 减轻伤口张力 D. 促进气体交换 E. 减轻心脏负担

9. 给长期使用抗生素治疗患者进行口腔护理时, 应注意观察:

A. 有无真菌感染 B. 有无黏膜溃疡 C. 有无口腔异味 D. 有无牙龈出血 E. 有无口唇干裂

10. 取用无菌溶液时, 先倒出少许溶液的目的是:

A. 查看溶液的颜色 B. 查看溶液的粘稠度 C. 冲洗溶液瓶口
D. 检查溶液有无异味 E. 检查溶液有无沉淀

11. 下列隔离预防措施错误的是:

A. 将同种病原体感染的患者安置于一室 B. 传染患者原则上不设陪护
C. 从事可能污染工作服的操作时, 穿隔离衣 D. 传染患者治疗时可离开病房
E. 需接触患者的分泌物时应戴手套

12. 戴无菌手套的正确方法是:

A. 戴手套前检查手套的号码 B. 戴手套前不必洗手但要修剪指甲
C. 未戴手套的手可触及手套的外面 D. 已戴手套的手可触及另一手套的内面
E. 戴好手套后两手应在胸部以上水平

13. 插胃管时, 患者出现呛咳、发绀, 应:

A. 嘱患者深呼吸 B. 嘱患者做吞咽动作 C. 托起患者头部再插管
D. 立即拔管, 休息片刻后重插 E. 稍停片刻继续插管

14. 留置导尿管时, 定期更换导尿管的目的是:

A. 减轻局部疼痛 B. 使患者得到暂时休息 C. 防止逆行感染
D. 防止导尿管老化 E. 锻炼膀胱的反射功能

15. 在大量不保留灌肠过程中, 患者感觉腹胀, 有便意, 处理方法是:

A. 拔出肛管, 停止灌肠 B. 嘱患者深呼吸并减慢灌肠速度 C. 稍移动肛管, 观察流速
D. 嘱患者忍耐片刻, 加大压力并快速灌入 E. 挤捏肛管, 嘱患者忍耐片刻

16. 护士给一慢性充血性心力衰竭患者口服地高辛时, 应特别注意:

A. 嘱患者服药后多喝水 B. 待患者服下后再离开 C. 给药前应测量脉率/律
D. 服药后不宜多喝水 E. 应将药研碎再喂服

17. 雾化吸入的目的不包括:

A. 镇咳化痰 B. 解除支气管痉挛 C. 预防感染 D. 湿化气道 E. 湿润口腔

18. 肌肉注射时, 选用联线法进行体表定位, 其注射区域正确的是:

A. 髂嵴和尾骨联线的外上 1/3 处 B. 髂嵴和尾骨联线的中 1/3 处
C. 髂前上棘和尾骨联线的外上 1/3 处 D. 髂前上棘和尾骨联线的中 1/3 处
E. 髂前上棘和尾骨联线的后 1/3 处

(此病例为 19~20 题共用) 患者, 女, 68 岁, 诊断: 脑梗死。医嘱: 速避凝 0.4ml H q12h。

19. 护士执行该医嘱的方法正确的是:

A. 注射前不必洗手、戴口罩 B. 注射部位皮肤不必常规消毒 C. 注射前不必排尽注射器内空气
D. 针尖、针梗、活塞体应保持无菌 E. 进针后检查有回血方可推注药液

20. 护士执行该医嘱时, 哪项做法不正确:

A. 注意工作环境光线充足、空间宽敞 B. 锐器盒应放在离操作者最近的位置
C. 摆好患者体位、充分暴露注射部位 D. 注射完毕, 注射器避免回套针头帽
E. 将用过的针头拧下后放入锐器盒内

21. 给患者静脉注射时, 推药有阻力, 抽之有回血, 局部无肿胀但有痛感。可能是:

A. 针头完全滑出血管外 B. 针头斜面部分穿透血管下壁 C. 针头部分阻塞
D. 针头斜面紧贴血管内壁 E. 静脉痉挛

22. 输液中发生肺水肿时吸氧需用 20%~30% 的乙醇湿化, 其目的是:

A. 使患者呼吸道湿化 B. 消毒吸入的氧气 C. 使痰液易咳出
D. 降低肺泡表面张力 E. 降低肺泡内泡沫表面张力

23. 抢救青霉素过敏性休克的首选药物为:

A. 异丙肾上腺素 B. 盐酸肾上腺素 C. 呼吸兴奋剂 D. 地塞米松 E. 升压药物

24. 输血所用的输入管道必须选用配有专门的:

A. 精密调速器 B. 颜色(可避光的棕色) C. 过滤网 D. 针头 E. 输液泵

25. 昏迷患者眼睑不能闭合, 应采取的措施是:

A. 按摩眼睑 B. 热敷眼部 C. 滴眼药水 D. 用无菌纱布遮盖 E. 用凡士林纱布遮盖

26. 某患者已行气管切开术。护士为其吸痰的方法错误的是:

A. 采用左右旋转并向上提管的方法 B. 连接吸痰管, 先试吸少量生理盐水
C. 先吸口鼻部、再吸气管切开处痰液 D. 插管时反折吸痰管末端以免产生负压
E. 调节负压至 40.0~53.3kPa (300~400mmHg)

27. 某肝癌患者行肝叶切除术后。医嘱：吸氧。护士对该患者的健康指导不包括：
 A. 不能自行摘除鼻导管 B. 检查鼻导管是否通畅 C. 不能自行调节氧流量
 D. 注意用氧安全 E. 进行有效呼吸
28. 支气管哮喘的发病本质是：
 A. 变态反应 B. 气道反应性增高 C. 气道炎症 D. 神经因素 E. 支气管感染
29. 推行肺结核全程督导治疗，最重要的目的是：
 A. 减少药物的用量 B. 及时发现药物的不良反应 C. 减少对家人的传染性
 D. 提高规则及全程用药依从性 E. 能及时调整治疗用药方案
30. 女患者，28岁，已婚。有“左下肺支气管扩张症”病史，因在半小时内咯血约300毫升而急诊。体查：T36.8℃，P88次/分，R18次/分，Bp110/65mmHg；神志清醒。医嘱给予“垂体后叶素”10单位静脉注射，在给药前应特别注意询问患者：
 A. 有无同样用药史 B. 有无药物过敏史 C. 以往的血压情况
 D. 有无冠心病史 E. 末次月经史
31. 以下哪项不属于重症肺炎的诊断标准：
 A. 持续胸痛 B. 意识障碍 C. 呼吸>30次/分
 D. 氧合指数(PaO₂/FiO₂)<300 E. 尿量<20ml/h
32. 以下符合II型呼吸衰竭诊断标准的血气分析特点是：
 A. PaO₂<40mmHg; PaCO₂>20 mmHg B. PaO₂<50mmHg; PaCO₂>60 mmHg
 C. PaO₂<60mmHg; PaCO₂>40 mmHg D. PaO₂<70mmHg; PaCO₂>30 mmHg
 E. PaO₂<80mmHg; PaCO₂>50 mmHg
33. 慢性II型呼吸衰竭的患者在给予鼻塞法吸氧一段时间后，患者皮肤黏膜发绀没有改善，并出现呼吸减慢(12次/分)，意识状态变差的情况，经检查发现患者家属将氧流量调在5L/min。你判断患者发生这种情况的原因最有可能是：
 A. 吸氧浓度不够 B. 气道有梗阻现象 C. 二氧化碳麻醉现象
 D. 氧气湿化不足 E. 发生氧中毒
34. 引起慢性肺源性心脏病肺动脉高压最重要的原因是：
 A. 肺毛细血管通透性增高 B. 肺动脉痉挛 C. 肺血管动静脉分流
 D. 肺动脉狭窄 E. 血液粘滞性增高
35. 关于心肌炎患者的护理哪项是错误的：
 A. 注意补充富含维生素C的食物 B. 鼓励患者早期活动以防止并发症
 C. 注意保持二便通畅 D. 严密观察患者的心率及心律 E. 注意控制补液速度
36. 心脏病患者，入院时查半坐卧位，神志清。T36.8℃，P112次/分，R32次/分，Bp110/65mmHg，该患者的心功能分级应为：
 A. V级 B. I级 C. II级 D. III级 E. IV级
37. 慢性浅表性胃炎最主要的病因为：
 A. 饮食不规律 B. 幽门螺杆菌感染 C. 环境因素 D. 自身免疫 E. 十二指肠液返流
38. 雷尼替丁治疗消化性溃疡的作用机制是：
 A. 抑制壁细胞Na⁺-K⁺-ATP酶的活性 B. 抑制组胺H₂受体 C. 抗胆碱能神经
 D. 抗胃泌素受体 E. 保护胃黏膜
39. 急性糜烂性出血性胃炎致上消化道大量出血时应根据下列哪项检查确诊：
 A. X线钡剂检查 B. 胃液分析 C. 临床表现 D. 胃镜检查 E. 胃黏膜脱落细胞学检查

40. 消化性溃疡合并大出血的特点，不正确的是：
 A. 出血后疼痛加重 B. 呕血常混有食物 C. 呕血呈酸性 D. 呕血常为咖啡色
 E. 出血后可发生氮质血症
41. 肝硬化患者，出现哪项临床表现最有助于帮助诊断合并肝性脑病：
 A. 突发晕厥 B. 血压下降 C. 扑翼样震颤 D. 皮下广泛出血 E. 腹水进行性加重
42. 急性胰腺炎患者因腹痛向腰背部放射而心情紧张，询问护士这是否表示病情严重。合适的回答是：
 A. 确实有这种可能 B. 可能并发其他疾病 C. 目前还不能确定 D. 不是这样的
 E. 这是本病腹痛的特点
43. 慢性阻塞性肺疾病最具标志性的临床表现是：
 A. 呼气时间缩短 B. 桶状胸 C. 反复咯血 D. 慢性咳嗽 E. 渐进性呼吸困难
44. 尿比重低且固定于1.010常见于：
 A. 急性肾炎 B. 急性膀胱炎 C. 慢性肾盂肾炎 D. 肾病综合征 E. 尿毒症
45. 引起肾病性水肿的主要原因是：
 A. 球-管失衡 B. 血浆胶体渗透压下降 C. 淋巴回流受阻 D. 肾小球滤过分数下降
 E. 毛细血管静水压增高
46. 男患者，48岁。反复水肿5年，进行性贫血6个月，恶心、皮下出血5天。拟“慢性肾衰竭尿毒症期”入院。Hb 60g/L，血肌酐780umol/L，引起该患者贫血最主要的原因是：
 A. 血清铁降低 B. 骨髓受抑制 C. 红细胞寿命缩短 D. 促红细胞生成素减少 E. 慢性失血
47. 男患者，62岁。患“慢性肾衰竭”，自诉疲乏、纳差、胸闷。体查：心率94次/分，心律不整，Bp170/102mmHg；测血钾7.8mmol/L，血肌酐660umol/L。此时最有可能危及患者生命的情况是发生：
 A. 代谢性酸中毒 B. 脑卒中 C. 心力衰竭 D. 休克 E. 心脏骤停
48. 某患者的血常规检查结果为：RBC 4.68×10¹²/L，Hb 96g/L，WBC 6.8×10⁹/L，Plt 220×10⁹/L。根据现有资料首先考虑为：
 A. 急性白血病 B. 再生障碍性贫血 C. 缺铁性贫血 D. 特发性血小板减少性紫癜
 E. 病毒感染
49. 以下哪项是缺铁性贫血较具特征性的临床表现：
 A. 指甲脆薄易裂 B. 便秘 C. 活动后气促 D. 月经失调 E. 皮肤黏膜苍白
50. 不符合特发性血小板减少性紫癜临床表现的是：
 A. 成年女性多见 B. 以皮肤黏膜出血为主要症状 C. 紫癜多无规律分布
 D. 血象以血小板减少为特点 E. 常伴有肝脾肿大
51. 患者因饮酒后出现局部淋巴结疼痛就诊，最可能是哪种疾病所致：
 A. 急性淋巴细胞性白血病 B. 特发性血小板减少性紫癜 C. 再生障碍性贫血
 D. 霍奇金淋巴瘤 E. 多发性骨髓瘤
52. 下列哪项与甲亢的病情轻重无关：
 A. 多汗的程度 B. 食欲增加的程度 C. 突眼的程度 D. 心率加快的程度 E. 体重下降的程度
53. 柯兴综合征的特征性表现主要包括：
 A. 向心性肥胖、多血质与皮肤紫纹 B. 向心性肥胖、多血质与高血压
 C. 向心性肥胖、高血压及面部痤疮 D. 向心性肥胖、高血压及皮肤紫纹
 E. 向心性肥胖、皮肤紫纹及感染

54. 糖尿病多尿的基本原因在于:
- A. 多饮 B. 多吃 C. 尿糖多 D. 出汗少 E. 抗利尿激素分泌过多
55. 最有助于 2 型糖尿病临床疗效判断的实验指标是:
- A. 空腹血糖 B. 餐后 2 小时血糖 C. 随意血糖 D. 糖化血红蛋白 E. 微量蛋白尿
56. 风湿性疾病关节痛的评估要点最重要的是:
- A. 发病的年龄与性别 B. 是否伴有活动受限 C. 是否伴有发热
D. 受累关节的部位及特征 E. 诱发或加重的因素
57. SLE 最具特征性的皮肤损害是脸部出现:
- A. 蝶形红斑 B. 盘状红斑 C. 环状红斑 D. 网状红斑 E. 光过敏
58. 类风湿性关节炎缓解期最重要的护理措施是:
- A. 加强营养 B. 加强受累关节的功能性锻炼 C. 做好受累关节的局部防寒与保暖
D. 避免过度疲劳 E. 避免受凉
59. 为了预防 SLE 发作, 下列哪项措施是**错误**的:
- A. 维持饮食平衡 B. 避免过度疲劳 C. 不宜妊娠 D. 多晒太阳以防缺钙 E. 育龄妇女应避免孕
60. 某下肢瘫痪患者, 肌肉可轻微收缩, 但不能活动关节, 肌力应为:
- A. 0 级 B. 1 级 C. 2 级 D. 3 级 E. 4 级
61. 脑出血最常见的病因是:
- A. 高血压 B. 颅内动脉瘤 C. 脑动脉畸形 D. 脑动脉炎 E. 血液病
62. 癫痫大发作时护理措施**错误**的是:
- A. 扶患者侧卧 B. 解开患者衣领 C. 在患者上下臼齿之间放压舌板 D. 按压抽搐肢体
E. 将患者头偏向一侧
63. 男患者, 35 岁, 在观看足球赛时突发剧烈头痛伴频繁呕吐, 继而神志不清。体查: 脑膜刺激征阳性, 肢体无瘫痪。考虑诊断为:
- A. 脑出血 B. 蛛网膜下腔出血 C. 脑膜炎 D. 脑血栓形成 E. 脑肿瘤
64. 某男, 30 岁, 因意外被困一山洞内 3 天, 极度口渴, 伴烦躁、乏力、皮肤弹性差。该患者最可能的脱水程度和类型为:
- A. 中度低渗性脱水 B. 轻度等渗性脱水 C. 中度等渗性脱水 D. 轻度高渗性脱水
E. 中度高渗性脱水
65. 某低血容量性休克患者在扩容治疗中, 测得中心静脉压 (CVP) 4cmH₂O, 血压 90/70mmHg。应考虑为:
- A. 血容量严重不足 B. 右心功能不全 C. 容量血管过度收缩 D. 容量血管过度扩张
E. 直接通路全面开放
66. 预防全麻患者发生误吸的主要措施是:
- A. 术前放置胃管 B. 术前禁食禁水 C. 选择静脉麻醉 D. 术前行阿托品 E. 术前行止吐药
67. 手术后切口记录为 II/丙, 代表:
- A. 可能污染伤口/伤口化脓 B. 污染伤口/愈合良好 C. 清洁伤口/伤口化脓
D. 污染伤口/伤口化脓 E. 可能污染伤口/愈合良好
68. 关于下肢丹毒早期处理, 下列哪项**不妥**:
- A. 处理原发病灶 B. 应用有效的抗菌素 C. 抬高患肢 D. 局部金黄散外敷 E. 尽早切开引流
69. 治疗破伤风时, 注射大量 TAT 的目的是:
- A. 控制和解除痉挛 B. 抑制破伤风杆菌的生长 C. 减少毒素的产生
D. 中和游离毒素 E. 中和游离与结合的毒素

70. 某成年男性, 头颈 (发、面、颈) 部、右上肢均被火烧伤。创面水疱较小, 基底苍白与潮红相间, 疼痛较轻。其烧伤面积和深度为:
- A. 9%, 浅 II 度 B. 9%, 深 II 度 C. 18%, 浅 II 度 D. 18%, 深 II 度 E. 27%, 浅 II 度
71. 某男, 38 岁, 4h 前负重物时, 右侧腹股沟斜疝被嵌顿, 下列哪项表现说明疝内容物已发生缺血坏死?
- A. 疝块增大, 不能回纳 B. 疝块紧张发硬 C. 疝块有压痛 D. 阵发性腹痛伴呕吐
E. 全腹有压痛, 腹肌紧张
72. 某男, 45 岁, 因胃溃疡行毕 II 式胃大部分切除术后第 7 日, 突发右上腹剧痛, 全腹有压痛、反跳痛和腹肌紧张, 以上腹部明显。应首先考虑为
- A. 吻合口出血 B. 输入襻梗阻 C. 倾倒综合征 D. 吻合口梗阻 E. 十二指肠残端破裂
73. 瘢痕性幽门梗阻患者, 术前 3 天每晚用温生理盐水洗胃的目的是:
- A. 减少胃酸分泌 B. 降低胃泌素水平 C. 便于手术切除 D. 减轻粘膜水肿和炎症
E. 减少术后出血
74. 发生单纯性机械性肠梗阻时, 典型的局部病理生理变化是:
- A. 梗阻以上肠段蠕动减弱或消失 B. 低位肠梗阻的肠腔扩张多不明显
C. 肠管内积气多源于细菌分解 D. 不存在肠管血运障碍
E. 梗阻以上部位肠腔扩张、梗阻以下肠管瘪陷
75. 某女, 35 岁, 长期便秘, 近两个月来排便时及排便后剧烈疼痛, 粪便表面带少量出血, 考虑最可能是:
- A. 肛门周围脓肿 B. 一期内痔 C. 二期内痔 D. 血栓性外痔 E. 肛裂
76. 肝癌患者术前肠道准备最主要的目的是:
- A. 预防术中污染 B. 有利切口愈合 C. 预防术后血氨增高 D. 预防术后肠道感染
E. 预防腹腔脓肿形成
77. Perthes 试验的目的是检查:
- A. 下肢浅静脉有无阻塞 B. 大隐静脉瓣膜功能是否正常 C. 交通支静脉有无阻塞
D. 下肢深静脉瓣膜是否正常 E. 下肢深静脉是否通畅
78. 脑室引流管应高于侧脑室平面
- A. 3-5cm B. 6-8cm C. 10-15cm D. 16-18cm E. 20-25cm
79. Glasgow 昏迷评分法, 昏迷的标准为:
- A. <15 分 B. <13 分 C. <10 分 D. <8 分 E. <3 分
80. 关于冬眠低温疗法的护理, 下列**不正确**的是:
- A. 先用冬眠药物后物理降温 B. 重点头部降温 C. 每小时降温 1℃为宜
D. 降温至肛温 32-34℃ E. 先停用冬眠药物后停物理降温
81. 胸外伤致胸壁软化 (浮动胸) 原因是:
- A. 2 根肋骨骨折 B. 多根多次肋骨骨折 C. 胸骨骨折 D. 反常呼吸
E. 二氧化碳潴留
82. 李先生, 行食管癌根治术后第 11 天, 进少量流食后出现高热、胸痛, 最可能的问题是:
- A. 脓胸 B. 乳糜胸 C. 吻合口狭窄 D. 吻合口瘘 E. 气胸
83. 在各种类型肺癌中预后最差的是:
- A. 鳞癌 B. 小细胞癌 C. 腺癌 D. 大细胞癌 E. 混合型肺癌
84. 某男, 30 岁, 下腹部外伤 3 小时, 出现小腹隐痛伴排尿困难, 试插导尿管可以顺利进入膀胱, 注入 200ml 生理盐水后抽出不足 150ml。应首先考虑为:
- A. 前尿道断裂 B. 后尿道断裂 C. 膀胱破裂 D. 膀胱并尿道损伤 E. 输尿管损伤
85. 于先生, 68 岁, 无明显诱因反复出现无痛性肉眼血尿 2 月余。经抗感染治疗未见明显效果。首先考虑的疾病是:
- A. 泌尿系结石 B. 泌尿系肿瘤 C. 泌尿系结核 D. 前列腺增生 E. 泌尿系感染

86. 肱骨髁上骨折造成手腕下垂畸形是由于损伤了:
A. 正中神经 B. 桡神经 C. 尺神经 D. 肱动脉 E. 桡动脉
87. 管型石膏固定的患者血液循环障碍最早出现的症状是:
A. 感觉异常 B. 疼痛 C. 苍白 D. 体温下降 E. 发绀
88. 某患者双下肢自主运动功能完全丧失, 其截瘫指数为:
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4
89. 有关急性化脓性骨髓炎, 下列哪项正确?
A. 最常见的致病菌是乙型链球菌 B. 多发生在骨干 C. 主要感染途径是淋巴系统
D. 老年人最易发病 E. 局部最早症状为疼痛
90. 骨肿瘤外科分期中 T₀ 表示肿瘤在:
A. 囊内 B. 间室内 C. 间室外 D. 跳跃转移 E. 远处转移

二. 多项选择题 (下列的每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 在每小题的备选答案中选出所有正确的答案, 写在答题纸上。共 20 题, 每题 3 分, 共 60 分)

多项选择题答题导引: 请严格按照以下格式 (5 小题一行), 把选项列在相应的题号后写在答题纸上。并注意字迹清晰。

1. ;2. ;3. ;4. ;5. ;
6. ;7. ;8. ;9. ;10. ;
.....

1. 以下属于健康的微观概念的是:
A. 健康不但是没有疾病, 还要有完整的生理、心理状态和良好的社会适应能力
B. 健康就是感到身体舒适 C. 健康是人体的功能活动正常
D. 健康是人体的生理、心理活动正常 E. 健康就是没有疾病
2. 帮助患者预防应对压力的方法包括:
A. 提供舒适安静的环境 B. 进行疾病有关的健康教育 C. 组织病友联谊会
D. 进行呼吸放松训练 E. 全面提供生活护理
3. 护士与患者交谈时的注意事项包括:
A. 根据护士的文化程度选择相应的语言 B. 与危重患者交谈时, 应抓住重点
C. 不要将自己的不良情绪带给患者 D. 对语言障碍者可用文字图表交流
E. 交谈距离最好为 30~40cm
4. 给患者进行乙醇拭浴降温时, 正确的是:
A. 告知患者拭浴的目的 B. 依次暴露拭浴部位 C. 头部置冰袋防止脚部充血
D. 足底置冰袋以助降温 E. 拭浴后 1 小时测量体温
5. 患者李某的骶尾部皮肤呈紫色, 有皮下硬结并出现水疱, 以下护理措施正确的是:
A. 定时协助翻身 B. 在无菌操作下抽出大水疱内液体 C. 将水泡表皮轻轻剪去
D. 创面涂消毒液, 用无菌纱布包扎 E. 保持床铺平整、清洁、干燥
6. 临床输液中预防微粒污染的主要措施有:
A. 净化操作环境 B. 正确切割、擦拭安瓿颈 C. 注射器忌多次用来抽吸药液
D. 加药针头应不带勾 E. 输液时减少输液瓶的摇动
7. 呼吸衰竭的患者, 由于二氧化碳潴留引起的临床表现是:
A. 搏动性头痛 B. 皮肤黏膜发绀 C. 睡眠颠倒 D. 球结膜充血 E. 出汗增多
8. 心绞痛与急性心肌梗死胸痛的主要区别点在于:
A. 胸痛的位置 B. 胸痛的程度 C. 胸痛持续的时间 D. 胸痛有无放射痛
E. 胸痛有无伴发严重并发症
9. 恶性心律失常应包括:
A. 室上性心动过速 B. 室性心动过速 C. III 房室传导阻滞 D. 尖端扭转型室性心动过速 E. 心室纤颤

10. 女患者, 65 岁。“冠心病”史 10 年。两天前受凉后, 自觉心悸、气促, 不能平卧伴尿少入院。体查: T 39℃, P 100 次/分, R 32 次/分, Bp 110/65mmHg; 半坐卧位, 颈静脉怒张; 双下肺闻及湿罗音; HR 100 次/分; 肝右肋下 3CM, 肝颈静脉回流征阳性; 下肢水肿(++)。目前该患者最突出的 3 个护理问题是:
A. 体温过高 B. 气体交换受损 C. 体液过多 D. 知识缺乏 E. 有皮肤完整性受损的危险

11. 男患者, 28 岁。因十二指肠球部溃疡出血入院。下列哪些临床表现和实验室检查提示有活动性出血:
A. 黑便次数增多粪质稀薄, 色泽转为暗红色 B. 反复呕血, 呕吐物为鲜红色
C. 血压继续下降 D. 血红蛋白计数继续下降 E. 肠鸣音亢进

12. 有助于减轻肾小球的高灌注、高压、高滤过的饮食原则是:
A. 高磷饮食 B. 优质低蛋白饮食 C. 高脂饮食 D. 低钠饮食 E. 高钙饮食

13. 女患者, 28 岁, 月经干净 1 天后出现尿频、尿急、尿痛。即查: 血白细胞 5.4×10⁹/L, 尿白细胞(+++), 该患者的护理措施应包括:
A. 注意休息 B. 多饮水 C. 指导患者缓解焦虑 D. 指导患者注意个人卫生
E. 按医嘱使用碱性药物

14. 内分泌-代谢性疾病患者常见的症状和体征包括有:
A. 身材过长或矮小 B. 肥胖或消瘦 C. 毛发改变 D. 不育或不孕 E. 皮肤黏膜色素沉着

15. 人体酸碱平衡的调节主要依靠:
A. 肾 B. 胃肠道 C. 皮肤 D. 血液缓冲系统 E. 肺

16. 甲状腺大部分切除术后出现手足抽搐, 饮食应限制:
A. 瘦肉 B. 海产品 C. 蛋类 D. 豆制品 E. 虾皮

17. 有关瘢痕性幽门梗阻的特点, 以下正确的是:
A. 有长期溃疡病史 B. 突出症状为呕吐 C. 呕吐多为宿食物、含胆汁
D. 可有胃型、胃蠕动波 E. 可发生低钾低氯性碱中毒

18. 胆道蛔虫病的发病过程中可并发:
A. 细菌性肝脓肿 B. 急性胰腺炎 C. 急性重症胆管炎 D. 胆道出血 E. 胆石症

19. 下列哪些属继发性脑损伤?
A. 脑震荡 B. 颅内血肿 C. 脑挫伤 D. 颅内高压 E. 脑疝

20. 闭合性单根单处肋骨骨折的处理有:
A. 止痛 B. 固定 C. 控制反常呼吸运动 D. 鼓励深呼吸和咳嗽 E. 预防破伤风

三. 病例分析 (请将答案写在答题纸上。共 5 题, 每题 12 分, 共 60 分)

1. 患者张某, 男, 50 岁。因反复发作性气促 5 年, 加重 1 天, 拟“重症哮喘, 急性支气管炎”收入院。现患者自觉鼻咽干痒、胸闷、呼吸费力, 咳嗽, 咳少量黄色粘稠痰。体检: T: 35.6℃, P: 110 次/分, R: 26 次/分, BP: 100/80mmHg。神志清, 面色青紫, 口唇发绀, 气管居中, 胸廓对称饱满, 肋间隙增宽, 呼吸运动增强, 叩诊过清音, 肺下界下移, 听诊肺呼吸音减弱, 呼气延长, 全肺满布哮鸣音。胸片: 双肺透亮度增高, 双肺纹理增粗。现您作为急诊主管护士接收该患者。请问:

- (1) 什么是主观资料、客观资料? 请根据以上资料, 分别列出患者 3 项主观资料和客观资料。
(2) 在记录资料的过程中, 应注意哪些问题?

2. 患者李某, 男, 60 岁。高血压病史 10 年。平时血压多波动在 140-180/90-100mmHg 之间。2 小时前, 在观看足球赛时, 突觉头痛剧烈、烦躁、心悸、气促、视物不清, 即由家人送往医院急诊。体查: T 37℃, P 110 次/分, R 26 次/分, Bp 220/130mmHg; 神清欠合作, 痛苦面容; 可以平卧;

HR110次/，律整，未闻病理性杂音；双肺未闻干湿性罗音。以“高血压危象”诊断收入院。请依据所给资料按优先原则提出3个护理诊断（包含合作性问题，护理诊断用P：E格式），并列护理措施。

3. 患者王某，男，18岁。20余天前开始出现颜面、双下肢浮肿，伴乏力，排泡沫样尿，尿量正常。起病以来体重增加5kg。查体：T 37.2℃，P 78次/分，R 20次/分，Bp 120/80mmHg；神志清楚；自主体位；颜面及双下肢凹陷性水肿。实验室检查：尿液检查：尿蛋白（+++），24小时尿蛋白定量5.9g；血液检查：血浆总蛋白33.2g/L，血浆清蛋白19.2g/L，血浆总胆固醇7.3mmol/L，甘油三酯2.9mmol/L。以“肾病综合症”诊断收入院。请依据所给资料按优先原则提出3个护理诊断（包含合作性问题，护理诊断用P：E格式），并列护理措施。
4. 患者刘某，男，35岁，不慎从高处坠地后出现呼吸困难、发绀、冷汗。体查：T 37℃，P110次/分，R 20次/分，BP 68/45mmHg；气管向左偏移，颈部广泛皮下气肿，右侧胸廓饱满，叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。请问：
 - (1) 最可能的诊断是？伴有主要问题？主要依据？
 - (2) 手术后置胸腔闭式引流，如何护理？
5. 患者邹某，男，42岁，午餐后1小时突感上腹突感上腹部刀割样剧痛6小时，伴恶心、未吐，发病后不久，伴下腹部疼痛，3小时后逐渐减轻，现因加重收入院治疗。既往曾经常自觉饥饿时胃痛，无正规治疗。查体：T 37.9℃，P 106次/分，R 24次/分，BP 110/80mmHg，急性病容，皮肤、巩膜无黄染，心肺正常，全腹压痛，反跳痛，上腹部最明显，腹肌紧张呈板状，肠鸣音明显减弱，肝浊音界存在，有移动性浊音，X线诊断未见明显游离气体，血白细胞 $14 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞占0.85。请问：
 - (1) 根据患者的表现，考虑最可能的疾病？
 - (2) 根据患者目前情况，提出3个主要的护理诊断？
 - (3) 目前应给予患者哪些处理措施？