

试 题 纸

课程名称: 909 兽医临床之家畜外科学 第 1 页 共 10 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效

一、单项选择题 (本大题共 50 小题, 每小题 1 分, 共 50 分)

在每小题列出的 A、B、C 和 D 四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在答题纸相应的位置。错选、多选或未选均无分。

- 1、受伤 8 小时内未经处理的开放性损伤是_____。
A、污染创 B、感染创 C、无菌创 D、陈旧创
- 2、浅在脓肿发生的部位不包括_____。
A、骨膜下 B、皮肤 C、筋膜下肌肉 D、皮下结缔组织
- 3、下列关于脓肿的说法不正确的是_____。
A、形成速度较慢 B、有波动性
C、触诊无疼痛 D、与周围组织界限清晰
- 4、压创的特点为_____。
A、出血少 B、疼痛不剧烈
C、创伤污染严重 D、以上都是
- 5、创伤按照致伤物的性状分类不包括_____。
A、切创 B、新鲜创 C、裂创 D、缚创
- 6、损伤的并发症有_____。
A、溃疡 B、窦道 C、坏疽 D、以上都是
- 7、可引起动物明显全身症状的疾病是_____。
A、血肿 B、脂肪瘤 C、蜂窝织炎 D、淋巴外渗
- 8、急性炎症的初期, 特别是渗出性炎症的早期, 应用_____可以减少炎症的渗出, 制止炎症的发展和制止溢血。
A、冷疗 B、温疗 C、电疗 D、刺激剂疗法
- 9、外科感染中, 在原发性病原微生物感染后, 经过若干时间又并发其它病原菌感染, 称为_____。
A、单一感染 B、混合感染 C、继发性感染 D、再感染
- 10、细菌经毛囊和汗腺侵入引起的单个毛囊所属皮脂腺的急性化脓性感染, 称为_____。
A、疖 B、痈 C、脓肿 D、蜂窝织炎
- 11、当发生外科感染时, 若致病菌毒力超过机体的抵抗力, 则感染不能局限, 可迅速向四周扩散, 形成_____。
A、慢性感染 B、全身感染 C、脓肿 D、蜂窝织炎
- 12、根据肿瘤的命名原则, 鳞状上皮细胞的肿瘤可以称为_____。
A、鳞状细胞纤维瘤 B、鳞状细胞癌

试 题 纸

课程名称: 909 兽医临床之家畜外科学 第 2 页 共 10 页

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效

- C、鳞状上皮细胞肉瘤 D、恶性上皮细胞瘤
- 13、恶性肿瘤对机体的危害主要体现在_____。
- A、膨胀性生长 B、侵袭性生长
C、产生过量激素 D、压迫邻近器官
- 14、肥大细胞瘤都发生于_____。
- A、皮下组织 B、黏膜下 C、筋膜 D、内脏
- 15、犬淋巴瘤的类型不包括_____。
- A、未分化型 B、多中心型 C、消化道 D、皮肤型
- 16、风湿病是一种常见的反复发作的急性_____炎症。
- A、化脓性 B、增生性
C、纤维素性 D、渗出性
- 17、犬角膜穿孔修复的方法是_____。
- A、皮瓣遮盖术 B、结膜缝合术
C、结膜瓣遮盖术 D、瞬膜瓣遮盖术
- 18、病毒性结膜炎时可用_____。
- A、氧氟沙星眼药水 B、红霉素眼膏
C、乙酰磺胺钠眼膏 D、黄降汞眼膏
- 19、面神经麻痹多见于_____。
- A、牛 B、马 C、羊 D、猪
- 20、额窦炎多见于_____。
- A、牛 B、马 C、羊 D、猪
- 21、牙齿发育异常不包括_____。
- A、赘生齿 B、牙齿更换不正常
C、滑齿 D、牙齿失位
- 22、静脉注射氯化钙溶液漏至皮下导致的颈静脉炎, 最佳的治疗方法是_____。
- A、局部冷敷 B、局部热敷
C、局部生理盐水冲洗 D、局部注射 10%-20%硫酸钠
- 23、犬, 5 岁, 头向一侧倾斜, 有时出现转圈运动。体温 39.7℃, 听力下降。耳镜检查见鼓膜穿孔, X 线检查鼓室泡骨性增生。此病不宜采用的治疗方法是_____。
- A、电烧灼 B、耳腔冲洗 C、抗生素滴耳 D、中耳腔刮除
- 24、与动物腹压无关的疝为_____。
- A、脐疝 B、脑疝 C、会阴疝 D、腹壁疝
- 25、疝的组成包括_____。

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效

- A、疝孔 B、疝囊 C、疝内容物 D、A+B+C
- 26、直肠脱的治疗方法不包括_____。
- A、黏膜剪除法 B、单手缝合法
C、固定法 D、直肠部分截除术
- 27、能够对锁肛和直肠闭锁进行鉴别诊断的是_____。
- A、是否有粪便排出 B、是否发生于初生仔畜
C、X线检查直肠末端有气体 D、食欲是否正常
- 28、临床确诊牛、马隐睾的方法是_____。
- A、叩诊 B、听诊
C、直肠造影 D、直肠检查
- 29、马肠扭转的最佳治疗方法是_____。
- A、翻滚法 B、针灸法
C、下泻法 D、手术整复
- 30、猪阴道脱出发生的主要机制是_____。
- A、固定阴道的组织松弛 B、会阴松弛
C、骨盆松弛 D、阴门松弛
- 31、不属于家畜跛行中特殊跛行的是_____。
- A、混合跛行 B、粘着步样
C、紧张步样 D、鸡跛
- 32、马斜板试验常用于确诊疼痛的关节是_____。
- A、肩关节 B、肘关节
C、腕关节 D、蹄关节
- 33、采用一条绳倒牛法保定牛时, 胸环应经过_____。
- A、颈部 B、肩关节
C、髓结节前 D、肩胛骨后角
- 34、用夹板绷带进行四肢骨折外固定时, 要求_____。
- A、衬垫与夹板等长 B、衬垫长、夹板短
C、衬垫短、夹板长 D、衬垫厚、夹板长
- 35、马膝内直韧带切断后, 适当牵遛至少应保持_____。
- A、1-3 天 B、4-6 天
C、10-12 天 D、2 周以上
- 36、犬下颌骨体正中联合处骨折最合适的治疗方法是_____。
- A、用骨螺钉固定 B、用髓内钉固定
C、用接骨板固定 D、用不锈钢丝固定
- 37、犬髋关节脱位整复手术中, 切除大转子的骨切线与股骨长轴呈_____。
- A、20 度 B、30 度

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效

A、疥螨病

B、脓皮症

C、蠕形螨病

D、马拉色菌病

48、犬大量脱毛, 稍痒, 用伍氏 (Wood's) 灯照射患部呈现苹果绿色荧光, 最可能的诊断是_____。

A、疥螨病

B、脓皮症

C、蠕形螨病

D、犬小孢子菌感染

49 皮肤局部色质发生变化而皮肤表面平整的是_____。

A、斑

B、丘疹

C、结节

D、脓包

50、蹄真皮的弥散性、无菌性炎症称为_____。

A、指 (趾) 间蜂窝织炎

B、蹄叶炎

C、蹄叉腐烂

D、指间皮炎

二、病例题 (本大题共 50 小题, 每题 2 分, 共 100 分)

在每小题列出的 A、B、C 和 D 四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请根据病例描述并结合题干, 将符合要求的备选项代码填写在答题纸相应的位置。错选、多选或未选均无分。

某犬, 车撞后 1 小时, 体温、脉搏、呼吸及运动均无异常, 仅见胸侧壁有一椭圆形肿胀, 触诊有波动感及轻度压痛感。

51、该犬最有可能出现_____。

A、疝

B、气肿

C、脓肿

D、血肿

52、与淋巴外渗相比, 该肿胀出现的速度一般要_____。

A、快

B、慢

C、一样快

D、不确定

一犬因胃扭转做了胃复位手术, 其腹壁切口位于脐前腹中线。

53、根据创伤的分类, 该手术创属于_____。

A、无菌创

B、污染创

C、感染创

D、陈旧创

54、按致创物的性状来分, 该创口属于_____。

A、刺创

B、压创

C、切创

D、裂创

55、正常情况下该切口的愈合过程可认为是_____。

A、一期愈合

B、二期愈合

C、痂皮下愈合

D、延期愈合

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效

一犬被其他犬咬伤, 临床检查可见损伤达肌肉深层, 创口较大, 表面沾有毛及草屑, 但无明显炎症反应和组织坏死及脓汁。

56、在治疗时对该创口进行充分清创的目的是促进创口_____。

- A、一期愈合
- B、二期愈合
- C、痂皮下愈合
- D、延期愈合

57、在对该犬治疗时应用维生素 C 的目的是_____。

- A、促进上皮细胞再生。
- B、促进神经纤维的再生。
- C、促进细胞间质和胶原纤维的形成。
- D、提高凝血酶原浓度, 加快血液凝固。

一只京巴犬, 10 岁, 视诊发现瞳孔呈灰白色, 但对散瞳和缩瞳药反应正常, 无视觉。

58、据上述信息可初步诊断该犬所患疾病可能是_____。

- A、白内障
- B、青光眼
- C、角膜炎
- D、虹膜炎

59、该犬眼睛可能发生病变的结构是_____。

- A、玻璃体
- B、角膜
- C、晶状体
- D、视网膜

60、若想扩大瞳孔便于进一步检查可使用_____点眼。

- A、毛果云香碱溶液
- B、毒扁豆碱溶液
- C、硫酸阿托品溶液
- D、乙酰胆碱溶液

一只母犬, 约 1 岁, 脐部出现局限性肿胀近 6 个月, 触诊该肿胀柔软, 饱食和挣扎时肿胀增大, 压迫肿胀可缩小, 皮肤无红、热、痛等炎性反应。

61、该病最可能的诊断是_____。

- A、疝
- B、肿瘤
- C、脓肿
- D、脐疝

62、手术治疗, 合理的手术切口形状为_____。

- A、“T”型
- B、直线型
- C、梭(菱)形
- D、十字型

63、闭合腹壁创口最适宜的缝合方法是_____。

- A、分层结节缝合
- B、分层连续缝合
- C、全层连续缝合
- D、全层结节缝合

一头犊牛, 出生后双前肢球节曲屈, 不能伸展, 以球节背面着地行走。X 线检查骨关节未见异常, 保守疗法无效。

64、根据以上信息可初步诊断该牛所患疾病为_____。

- A、球节挛缩
- B、幼畜屈腱挛缩

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效

C、幼畜屈腱断裂

D、幼畜腱鞘炎

65、若采取手术治疗, 则该病的最佳手术疗法为_____。

A、球节切开术

B、指浅屈肌腱切断术

C、指深屈肌腱切断术

D、指外侧伸肌腱切断术

成年牛滑倒后不能起立, 强行站立后患后肢不能负重, 比健肢缩短, 抬举困难, 以蹄尖拖地行过。髋关节他动运动, 有时可听到捻发音。

66、最可能的诊断是_____。

A、髌骨骨折

B、股骨骨折

C、髌骨体骨折

D、髋关节脱位

67、进一步确诊的最佳方法是_____。

A、抽屉试验

B、患部视诊

C、X线检查

D、长骨叩诊

68、若直肠检查在闭孔内摸到股骨头, 该病牛可诊断为_____。

A、前方脱位

B、后方脱位

C、内方脱位

D、上方脱位

某犬在采食中突发吞咽障碍, 流涎, 干呕, 烦躁不安; X线检查发现在胸腔入口前气管背侧有一不规则形状的高密度阴影。

69、根据以上信息, 可初步诊断该犬所患疾病为_____。

A、气管阻塞

B、食道梗阻

C、胃扭转

D、肠梗阻

70、该病的最佳手术治疗方案是_____。

A、开胸术

B、喉囊切开术

C、食管切开术

D、气管切开术

某种公猪, 80kg, 不宜留做种用, 欲对其行睾丸摘除术。

71、该手术的名称是_____。

A、去势术

B、绝育术

C、节育术

D、经济手术

72、手术过程中打开总鞘膜后暴露精索, 摘除睾丸的最佳方法是将精索_____。

A、用手捋断

B、捻转后切除

C、结扎后切除

D、不结扎, 捋断

一头奶牛, 5岁, 右侧腹壁有一直径约 30cm 的肿胀物, 触诊局部柔软, 用力推压内容物可还纳腹腔, 并可摸到腹壁有一直径约 10cm 左右的破裂孔。

73、下列对该病的描述正确的是_____。

A、嵌闭性疝

B、不可复性疝

C、可复性疝

D、脐疝

74、该病最佳治疗方案是_____。

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效

A、热敷

B、手术修补

C、封闭疗法

D、涂擦刺激剂

一奶牛, 在快速奔跑过程中突然滑倒, 随后出现跛行。

75、应用跛行诊断法确定患肢, 首先采取的诊断方法应是_____。

A、视诊

B、听诊

C、触诊

D、叩诊

76、若该牛表现为悬跛, 则在其临床表现中不会出现的一项是_____。

A、抬不高、迈不远

B、运步缓慢

C、系部直立

D、前方短步

77、若该牛患肢表现为不能以蹄全缘负重, 仅用蹄尖着地, 或虽以蹄全缘着地, 但上部关节屈曲, 运步时可出现明显的提伸障碍, 可知该牛的跛行程度为_____。

A、轻度跛行

B、中度跛行

C、重度跛行

D、无跛行

博美犬, 4 岁, 1 周来经常摩擦和舔肛部, 临诊发现肛门部肿大, 肛门下方两侧破溃, 流脓性分泌物, 触诊敏感。

78、根据上述症状可初步诊断该犬所患疾病可能是_____。

A、脱肛

B、直肠脱

C、肛门腺炎

D、阴道脱

79、下列疗法中不适用于该病治疗的是_____。

A、烧烙疗法

B、手术治疗

C、冲洗疗法

D、缝合破溃口

大丹犬, 四肢、躯干、腹部多处有铜钱大脱毛区, 局部皮屑较多, 并有向外扩散趋势。

80、根据临床表现, 该病最不可能的病原是_____。

A、葡萄球菌

B、须毛癣菌

C、石膏样小孢子菌

D、犬小孢子菌

81、如用伍氏灯检查荧光阳性, 最适合的治疗药物是_____。

A、制霉菌素

B、伊维菌素

C、头孢噻呋

D、赛拉菌素

雌性腊肠犬, 6 岁, 一个月来精神沉郁, 时有发热, 抗生素治疗后, 病情好转, 停药后复发。现病情加重, 阴部流红褐色分泌物, B 超探查见双侧子宫角增粗, 内有液性暗区。

82、该病例错误的治疗方法是_____。

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效

A、孕酮治疗

B、氧氟沙星治疗

C、氯前列醇治疗

D、卵巢子宫切除术

83、该病例手术时, 如牵引卵巢困难, 应先撕断卵巢系膜上的_____。

A、阔韧带

B、圆韧带

C、悬韧带

D、固有韧带

84、该病例手术时, 必须要结扎_____。

A、卵巢

B、阴道基部

C、子宫角

D、子宫体

一匹赛马, 障碍赛时摔倒, 左前肢跛明显, 前臂上部弯曲, 他动运动有骨摩擦音, 患部肿胀, 未见皮肤损伤, 全身症状不明显。

85、本病最可能的诊断是_____。

A、骨裂

B、腕关节脱位

C、肘关节脱位

D、闭合性骨折

86、本病的确诊方法是_____。

A、触诊

B、X 线检查

C、斜板试验

D、关节内窥镜检查

87、本病最适宜的保守治疗方法是_____。

A、绷带包扎

B、石膏绷带

C、酒精热绷带

D、石膏夹板绷带

德国牧羊犬, 2 岁, 雄性, 近 2 个月来在右肘头出现一个鸡蛋大小逐渐增大的波动性肿胀, 无热无痛, 未见明显跛行。

88、该肿胀最可能的诊断是_____。

A、血肿

B、黏液囊炎

C、蜂窝织炎

D、淋巴外渗

89、确诊本病不宜采用的方法是_____。

A、X 线检查

B、无菌穿刺

C、超声检查

D、血常规检查

90、根治该病最佳的方法是_____。

A、肿胀物摘除术

B、引流

C、封闭疗法

D、涂擦刺激剂

奶牛, 跛行, 体温 40.5°C , 四肢蹄部肿胀, 触诊有热痛, 右后肢蹄底有窦道, 内有恶臭坏死物; 病原检查发现坏死杆菌。

91、该病最可能的诊断结论是_____。

A、蹄叶炎

B、腐蹄病

C、局限性蹄皮炎

D、指(趾)间皮炎

92、对该病的治疗错误的一项是_____。

A、全身应用抗生素

B、蹄局部防腐清洗

注意: 所有答案必须写在答题本上, 不得写在试题纸上, 否则无效

C、蹄部密闭包扎

D、局部应用抗生素

一雌性京吧犬, 10 岁, 精神沉郁, 腹围增大, 喜饮水, 在近期出现持续发情症状, 体温升高至 40°C 。血常规检查白细胞总数升高。B 超检查显示其腹部有多个圆形液性暗区, 腹腔子宫穿刺可见脓汁。

93、若该犬阴道无脓性物排出, 则最佳治疗方案是_____。

A、手术疗法

B、抗菌疗法

C、激素疗法

D、输液疗法

94、若该犬阴道有较多脓性分泌物排出, 为促进子宫蓄脓脓液排出, 最适治疗方案是_____。

A、手术疗法

B、抗菌疗法

C、激素疗法

D、输液疗法

95、若该病经全身抗生素治疗无效, 一般采用的手术治疗为_____。

A、子宫切开排脓术

B、子宫穿刺排脓术

C、子宫摘除术

D、子宫冲洗引流术

一只雄性京巴犬, 4 岁, 主诉其从前天开始排尿困难, 仅流出滴状血红色尿液, 精神沉郁, 食欲减少几乎废绝。临床检查发现, 该犬体温 40.5°C , 腹壁触诊膀胱部有硬实感, X 线检查发现有高密度阴影, 尿三段法实验, 中段尿呈现红色。

96、该犬可能患有的疾病是_____。

A、尿道结石

B、膀胱结石

C、肾炎

D、肾结石

97、中段尿呈红色, 说明血尿发生于_____。

A、肾脏

B、膀胱

C、尿道

D、全身

一头水牛, 在与其他牛打斗时导致腹壁破裂, 伴发肠管流出到体外。

98、该牛所患疾病为_____。

A、胸壁透创

B、腹壁透创

C、腹壁疝

D、脐疝

99、下列表现中可以判断需要进行肠管切除的一个是_____。

A、肠壁呈粉红色

B、肠管温敷后仍不蠕动

C、肠壁呈暗红色

D、肠系膜血管充血

100、若进行肠管切除术, 下面术后恢复过程中禁食时间正确的一个是_____。

A、半小时

B、半天

C、半周

D、半月