

青岛大学 2009 年硕士研究生入学考试试题

科目代码 702

科目名称 口腔综合 (共 6 页)

请考生写明题号，将答案全部答在答题纸上，答在试卷上无效

一、填空题 (每空 1 分，共 40 分)

1. 口腔种植体分为：粘膜内种植体、_____和_____。
2. 下颌骨骨折的好发部位为：_____、_____、_____、与_____。
3. 牵张成骨的三要素：_____、_____、_____和_____。
4. 在固定桥的桥基牙选择时，较理想的冠根比例为_____或_____，最低限度为_____。
5. 戴用全口义齿后，如果由于后牙排列超牙合_____过小，出现咬颊或咬舌时，可磨改上颌_____或下颌_____，解决咬舌现象。
- 6 牙体缺损是_____。
7. 全口义齿修复中，补偿曲线曲度增加，定位平面斜度_____。
8. 可摘局部义齿修复中，塑料基托一般不小于_____mm；金属基托厚度为_____mm。
9. 基牙倒凹的深度是指_____。
10. 根据牙合架模拟下颌运动的程度分为_____、_____和_____。
11. 上颌侧切牙舌侧窝处的窝洞属于 G. V. Black 分类的_____类。
12. 龋损的好发牙面_____，_____，_____。
13. 匙形刮治器分_____，_____。
14. 与侵袭性牙周炎关系密切的细菌是_____。
15. 舌前 2/3 的味觉由_____神经纤维支配，舌后 1/3 的味觉由_____神经支配。
16. 活动矫治器是由_____、_____、_____三部分组成的。
17. 耳点根据确定的方法不同分为_____和_____。
18. 临床上固定矫治器一般间隔_____周加力一次为宜；活动矫治器间隔_____周加力一次。

二、单选题（每题 1 分，共 30 分）

1、Torque 弯曲主要使用在哪种弓丝上？

- A 镍钛圆丝 B 镍钛方丝 C 不锈钢圆丝 D 不锈钢方丝

2、MBT 矫治技术属于

- A 功能矫治技术 B Begg 矫治技术 C 直丝弓矫治技术 D 口外支抗矫治技术

3、头帽颏兜常用作生长发育期下列哪种畸形矫治后的保持

- A 严重上颌发育不足 B 严重上颌前突 C 严重下颌后缩 D 严重下颌前突

4、在方丝弓矫治技术中常需要弯制几个序列弯曲

- A. 2 个 B 3 个 C. 4 个 D. 5 个

5、需考虑外科正畸治疗的是

- A 严重牙列拥挤。B 儿童严重骨性开合。C 成人严重骨性反合。D 上前牙严重唇倾的成人患者。

6. 固定桥修复的生理基础是

- A. 牙槽骨 B. 牙周储备力及代偿功能 C. 基牙代偿力 D. 牙槽嵴粘膜 E. 以上都不对

7. 卡臂的起始部分位于基牙轴面非倒凹区

- A. 起固位作用，防止义齿合向脱位 B. 起固位作用，防止义齿侧向脱位
C. 起稳定作用，防止义齿合向脱位 D. 起稳定作用，防止义齿侧向脱位
E. 起支持作用，防止义齿龈向脱位

8. 上颌磨牙桩冠修复时最可能利用的根管是

- A. 近中颊根管 B. 近中舌根管
C. 腭根管 D. 以上都是
E. 以上都不是

9. 关于牙合 支托的描述错误的是

- A. 可以支承、传递合力 B. 防止食物嵌塞和恢复合关系
C. 近合缘处较窄，向合中心变厚 D. 可防止义齿下沉，稳定义齿
E. 合支托凹底面应与基牙长轴垂线约成 10-20°

10. 以下哪项不是基托作缓冲的目的

- A. 防止压痛
B. 防止有碍发音

- C. 防止压迫龈组织
 - D. 防止压伤粘膜组织
 - E. 防止基托翘动
11. 关于基托的功能，下列哪项是错误的？
- A. 支持作用，不使义齿下沉
 - B. 承担合力
 - C. 传递合力
 - D. 分散合力
 - E. 修复软组织缺损
12. 一患者多数下颌后牙缺失，前牙松动，舌侧倒凹明显，口底到龈缘的距离 6mm，大连接体宜用
- A. 倒凹区之上的舌杆 B. 离开粘膜表面，与牙槽嵴平行的舌杆
 - C. 与粘膜平行的接触的舌杆 D. 舌板 E. 都不适宜
13. 全口义齿蜡型装盒法多采用
- A. 整装法 B. 分装法 C. 混装法 D. 倒置法 E. 以上都不是
14. 与舌杆相比，下列哪种情况更适于设计舌板
- A. 口底深
 - B. 舌侧软组织从口底到龈缘的距离在 7mm 以上
 - C. 舌隆突不明显
 - D. 前牙松动需用夹板固定者
 - E. 舌侧倒凹不大
15. 间接固位体与支点线的描述中错误的是
- A. 间接固位体距支点线的垂直距离越大，对抗转动的力越强
 - B. 支点线到游离端基托远端的距离最好等于支点线到间接固位体的距离
 - C. 力臂越长，产生的力矩越大
 - D. 力臂越长，所起的平衡作用越好
 - E. 远中游离端缺牙时，可用前牙区多基牙联合支持，发挥间接固位作用
16. 以下关于增加冠桩固位的方法，不正确的是
- A. 根管口预备一小肩台
 - B. 增加桩与管壁的密合度
 - C. 选用优良粘结剂
 - D. 尽可能保留残冠硬组织

E. 尽可能去除残冠硬组织

17. 女, 45 岁两侧下后牙缺失影响功能, 要求可摘义齿修复。查右下 67 和左下 567 缺失, (右下 8 未缺失), 右下 45 松动 II⁰, 根露 1/4。对 45 的正确处理是

- A. 拔除
- B. 牙周治疗后, 设计联合卡环以分散合力
- C. 牙周治疗后, 设计连续卡环
- D. 牙周治疗后, 设计延伸卡环
- E. 牙周治疗后, 改应力中断式卡环

18. 牙源性良性肿瘤中最常见的是:

- A. 成釉细胞瘤 B. 牙源性粘液瘤 C. 牙骨质瘤 D. 牙瘤

19. 口腔颌面部外伤急救措施不包括:

- A. 防止窒息 B. 止血 C. 抗休克治疗 D. 骨折切开复位固定

20. 放射性骨坏死的可能致病因素不包括:

- A. 放射 B. 出血 C. 创伤 D. 细菌感染

21. 最常见的颌骨骨髓炎为

- A. 化脓性 B. 特异性 C. 物理性 D. 化学性

22. 下列为牙源性颌骨囊肿的是:

- A. 鼻腭囊肿 B. 正中囊肿 C. 血外渗性囊肿 D. 根端囊肿

23. 种植手术用骨钻钻孔, 钻速不能超过-----r/min

- A 1000; B 1500; C 2000; D 2500

24. 下齿槽神经麻醉的标志是

- A 下颌孔; B 卵圆孔; C 颏孔; D 棘孔

25. 易沿神经扩散, 浸润性极强的肿瘤是:

- A 粘液表皮样癌; B 腺样囊性癌; C 多形性腺瘤; D 基底细胞样腺癌。

D. 临床检查 E. 详细的询问病史。

26. 旋转皮瓣属于以下哪一类皮瓣:

- A 轴型皮瓣; B 岛状皮瓣; C 游离皮瓣; D 带蒂皮瓣

27. 疼痛发作时不伴有自主神经症状的是

- A 中间神经痛; B 蝶腭神经痛; C 神经官能症性面痛;

D 耳颞神经痛; E 簇集性头痛

28. 双侧真性颞下颌关节强直特征性面部畸形为:

A 下颌前突；B 下颌后缩；C 上颌前突；D 上颌后缩；E 偏牙合

29. 目前，多主张在什么年龄行腭裂整复术

- A. 6 月龄；B. 18 个月左右；C. 3 岁左右；
D. 5—6 岁；E. 8—12 岁

30. 牙槽突骨折固定时牙弓夹板和正畸托槽的放置均应跨过骨折线至少
个牙位。

- A 2； B 3； C 4； D 5

三、名词解释（每题 5 分，共 50 分。可任选 10 题）

- 1、继发龋
2. 工作长度
- 3、retrograde pulpitis
- 4、Attachment loss
5. 牙列的 Wilson 曲线
- 6、Moyers 预测
- 7、A 点
8. 三叉神经痛
9. 制锁状态
10. Denture space
11. 压力式印模
12. 颤动线

四、简答题（每题 10 分，共 100 分，可任选 10 题）

简述可摘局部义齿戴后出现义齿咀嚼功能差的原因和处理方法。

乳牙和恒牙的萌出顺序？

简述葡聚糖在致龋中的作用？

拔牙后注意事项是什么？

简述牙髓腔的增龄性变化？

什么是牙尖交错位和后退接触位？

替牙期的暂时性错合有哪些？

试述可摘局部义齿与固定义齿的区别？

简述全口义齿垂直距离恢复不正确的影响？

试述造成可摘局部义齿不稳定的原因？

什么是牙齿的磨耗？磨耗的生理意义有哪些？

五、问答题（每题 20 分，共 80 分，题 5 为必答题，其余可任选 3 题）

1. 论述可摘局部义齿不稳定的临床表现及其在临床上应采用哪些措施来处理。
2. 正畸减数（拔牙）设计中需要考虑的因素有哪些？
3. 简述沃辛瘤的临床特点。
4. 口腔白斑的临床表现及病理表现。
5. 试述糖尿病对牙周炎治疗的影响。