

青岛大学 2010 年硕士研究生入学考试试题

科目代码： 702 科目名称： 口腔综合 （共 10 页）

请考生写明题号，将答案全部答在答题纸上，答在试卷上无效

一、选择题（共 100 分，每题 1 分）

- 慢性中央性颌骨骨髓炎病变局限者，死骨分离的时间约在发病后的_____
A 3-4 月 B 3-4 周 C 2 月 D 2 周
- 慢性边缘性颌骨骨髓炎已明确骨质破坏的部位和范围，一般在病程_____后即可施行病灶清除术
A 2 月 B 1 周 C 2-4 周 D 5-6 周
- 下颌角骨折，骨折线位于咬肌附丽之前，下列描述正确的是_____
A 前骨折段向下外移位 B 后骨折段向上前移位 C 后骨折段向下内移位 D 不发生移位
- 唾液腺肿瘤中最为常见的是：
A 多形性腺瘤； B 沃辛瘤； C 粘液表皮样癌； D 腺样囊性癌
- 舌癌常发生早期颈淋巴结转移，且转移率较高，即使临床上扪不到肿大淋巴结，也需同时施行-----颈淋巴清扫术
A 根治性； B 治疗性； C 选择性； D 功能性
- 口腔黏膜黑斑约有-----可发生恶变。
A 20%； B 30%； C 40%； D 60%
- 腭前神经麻醉的进针标志是
A 眶下孔； B 切牙孔； C 圆孔； D 腭大孔
- 制备种植窝时骨床的温度不应超过-----度
A 36； B 42； C 47； D 52
- “早发现、早诊断、早治疗”属于肿瘤的_____级预防？
A I 级； B II 级； C III 级； D IV 级
- 单侧唇裂整复术的较合适的年龄在
A 1-2 月龄； B 3-6 月龄； C 1-2 岁； D 3-6 岁； E 6-8 岁
- 智齿冠周炎急性期的治疗原则不包括_____
A 拔除智齿 B 消炎镇痛 C 切开引流 D 全身营养治疗
- 髁突头上面有一横嵴将其分为前、后两斜面，许多关节疾病常破坏：
A 前斜面； B 后斜面； C 双板区； D 横嵴

13. 三叉神经痛行阿霉素注射治疗，下列描述错误的是： ____
- A 注射于周围神经干上 B 原理是使局部神经纤维变性阻断神经传导 C 复发后可多次注射 D 可以注射于神经周围使神经麻痹
14. 关于牙槽突裂植骨的描述，错误的是____
- A 尖牙萌出后较为恰当； B 一般为 9-11 岁；
C 为鼻底和唇提供稳固的支架； D 应用骨松质优于骨皮质
15. 正颌手术术前正畸的目的不包括____
- A 矫正错位牙 B 消除颌干扰 C 升高 Spee 曲线 D 排齐牙列，去代偿
16. 前臂皮瓣属于下列哪种皮瓣： ____
- A 全厚皮片 B 游离皮瓣 C 带蒂皮瓣 D 轴型皮瓣
17. 腮腺手术后出现眼睑闭合不全，因为损伤了__神经
- A 面神经颞支 B 眶上神经 C 面神经颧支 D 动眼神经
18. 下列哪种情况下可以拔牙____
- A 6 个月内心梗 B 心绞痛 C 急性牙龈炎 D 血压 160/100mmHg
19. 下列哪一个不是干槽症的病因学说____
- A 疼痛学说 B 感染学说 C 创伤因素学说 D 纤维蛋白溶解学说
20. 种植体与牙周支持组织的界面不包括____
- A 骨结合 B 半桥粒结合 C 纤维-骨性结合 D 牙周膜结合
21. 智齿冠周炎急性期的治疗原则不包括____
- A 拔除智齿 B 消炎镇痛 C 切开引流 D 全身营养治疗
22. 牵张速度是指每日牵开的骨断端之间的距离，公认的较理想的速度是：
- A 1mm/d； B 2mm/d； C 3mm/d； D 5mm/d
23. 柯萨奇 A16 型病毒是哪种疾病的致病微生物
- A 手足口病； B 带状疱疹； C 疱疹性咽峡炎； D 原发性疱疹性口炎
24. 被称为“口-眼-生殖器三联征”的疾病是
- A 疱疹性口炎； B 赖特尔综合征； C 白塞病； D 疱疹性口炎
25. 如果 11、13、16、21、23、26、31、32、33、36、41、42、43、46 号牙的切缘或牙尖出现釉质发育不全，表示致病因素出现在
- A 1 岁以内； B 1-2 岁； C 2-3 岁； D 3 岁以后
26. 防止根管治疗器械落入消化道或呼吸道的最好办法是
- A 使用机用器械； B 器械柄安全链； C 上橡皮障； D 扩大开髓洞形
27. 龋病病因的四联因素是

- A 菌斑 细菌 酸 碳水化合物； B 细菌 食物 牙齿 年龄
 C 细菌 蔗糖 唾液 时间； D 细菌 食物 宿主 时间
28. 备洞时下列那一项可增加对牙髓的刺激
 A 间断磨除； B 连续磨除； C 冷却水降温； D 选用锐利的车针
29. 下列哪种疾病不引起牙本质过敏症
 A 磨损； B 龋病； C 牙周萎缩，牙颈部暴露； D 牙髓坏死
30. 对牙髓组织刺激最小的材料是
 A 氧化锌丁香油糊剂； B 磷酸锌粘固粉； C 聚羧酸锌粘固粉； D 氢氧化钙
31. 急性根尖周炎最有效的应急处理是
 A 开髓，根管引流； B 安抚镇痛； C 患牙调合镇痛； D 服用消炎镇痛药
32. 下面哪种不是牙周炎的辅助检查方法
 A 压力敏感探针； B X线片数字减影技术； C 选择性麻醉； D 龈沟液检查
33. 下面哪种治疗不属于牙周基础治疗
 A 菌斑控制； B 洁治术； C 龈下刮治术； D 牙龈成形术
34. 起病急、病程短，以龈乳头和龈缘的坏死为其特征性损害，以下前牙多见，龈乳头中央凹下如火山口状。这是哪种疾病的表现
 A 牙龈纤维瘤病； B 急性坏死性溃疡性龈炎； C 白血病牙龈病损； D 急性多发性龈脓肿
35. 靶形红斑好发于哪种口腔粘膜病
 A 疱疹性口炎； B 多形性红斑； C 寻常性天疱疮； D 扁平苔藓
36. 哪种疾病不属于癌前病变
 A 扁平苔藓； B 口腔白斑病； C 口腔红斑病； D 血管神经性水肿
37. 哪种疾病不属于牙髓病
 A 致密性骨炎； B 残髓炎； C 牙内吸收； D 髓石
38. 多发C形根管的牙位是
 A 下颌第一磨牙； B 下颌第二磨牙； C 上颌第一磨牙； D 上颌第二磨牙
39. 根尖诱导成形术诱导根尖形成的组织机制不包括
 A 根尖部残留活髓； B 根尖部牙乳头； C 上皮根鞘； D 牙槽骨
40. 恒牙龋齿患龋率最高的牙齿是
 A 上颌第一磨牙； B 下颌第一磨牙； C 上颌第二磨牙； D 下颌第二磨牙
41. 牙震荡不正确的处理是
 A 患牙休息； B 必要时调合； C 立即行牙髓摘除术； D 定期复查，必要时做根管

治疗术

42. 若诊断为可逆性牙髓炎，临床检查最重要的是

A 牙龈出血； B 龈下牙石； C 深的龋洞； D 深牙周袋

43. 下列哪项不符合龈下牙石

A 形成与唾液分泌有关； B 位于龈沟内；
C 不易刮除； D 质地坚硬

44. 在癌前病变中，癌变几率最大的是

A 扁平苔藓； B 白斑； C 红斑； D 疣

45. 疱疹性龈口炎的病因是

A 病毒； B 细菌； C 真菌； D 衣原体

46. 引起牙龈炎最主要的细菌是：

A 革兰阳性杆菌； B 革兰阴性杆菌； C 螺旋体； D 粘性放线菌

47. 正常牙周探诊深度：

A ≤ 1 mm； B ≤ 2 mm； C 2~3 mm； D ≤ 3 mm

48. 龈上牙石易沉积于：

A 上前牙邻面； B 双尖牙； C 磨牙； D 后牙颊面和下前牙舌面

49. 牙周病的局部促进因素不包括：

A 牙面及白垢； B 食物嵌塞； C 咬合创伤； D 酸、碱等化学刺激

50. 铸造全冠预备时轴臂正常聚合角一般为

A 0° ； B $2^\circ-5^\circ$ ； C $6^\circ-10^\circ$ ； D $10^\circ-20^\circ$ ； E. 无具体要求

51. 烤瓷合金的热膨胀系数（金 α ）与烤瓷粉的热膨胀系数（瓷 α ）的关系是

A 金 $\alpha <$ 瓷 α ； B 金 $\alpha >$ 瓷 α ； C 金 $\alpha =$ 瓷 α ；
D A、B 都对； E. B、C 都对

52. 患者缺失一颗前牙，其他牙有散在间隙，最好的处理方法是

A. 仅修复缺失牙； B. 修复缺失牙并用光敏修复间隙；
C. 作烤瓷冠； D. 拔除有间隙的牙；

E. 先正畸关闭间隙后再修复增加

53. 义齿修复前骨尖修整的最佳时机是

A 拔牙后 2 周； B 拔牙后 3 周； C 拔牙后 2 个月以上；
D 拔牙后 6 个月； E 拔牙后 1 年

54. 卡臂的起始部分位于基牙轴面非倒凹区

A 起固位作用，防止义齿合向脱位； B 起固位作用，防止义齿侧向脱位；

C 起稳定作用，防止义齿合向脱位； D 起稳定作用，防止义齿侧向脱位；
E 起支持作用，防止义齿龈向脱位

55. 增强桩核固位的方法，除了

A 尽可能保留残冠硬组织； B 尽可能利用根管长度；
C 增加桩与管壁的密合度； D 根管预备成圆柱形；
E 正确使用粘结剂

56. 大连接体的主要作用是

A 连接局部义齿各部分； B 连接局部义齿各部分，支持作用；
C 连接局部义齿各部分，支持和稳定作用； D 连接局部义齿各部分，传导和分散始力；
E 连接局部义齿各部分，传导和分散合力，增加义齿强度

57. 牙槽突骨折固定时牙弓夹板和正畸托槽的放置均应跨过骨折线至少____个牙位。

A 2； B 3； C 4； D 5

58. 全口义齿的印模属于

A 加压印模； B 初步印模； C 功能性印模； D 解剖式印模； E 闭口印模

59. 间接固位体的作用是

A 增强义齿的固位、稳定和强度； B 增强义齿的固位、稳定和美观；
C 增强义齿的固位、支持和强度； D 增强义齿的固位、支持和稳定；
E 增强义齿的固位、支持和舒适

60. 有根尖漏管的患牙根充后桩冠修复开始的时机一般是

A 3天后； B 1周后； C 2周后； D 无自觉症状时； E 漏管闭合后

61. 与铸造全冠相比，3/4冠的主要优点，除了

A 美观； B 龈缘刺激小； C 就位容易； D 强度好； E 磨牙少

62. 不宜用金瓷冠修复的是

A 锥形牙； B 错位前牙； C 四环素牙； D 青少年恒牙； E 活髓牙

63. 以下关于全冠取印模前排龈的描述哪项是错误的？

A 排龈线中用血管收缩剂； B 可止血；
C 增强印模的准确性； D 排龈线中用肾上腺素最佳；
E 减少组织液渗出

64. 以下哪项不是全冠印模的要求？

A 边缘清晰； B 表面清晰； C 合关系正确； D 无变形； E 印模边缘伸展充分

65. RPA 卡环组与 RPI 卡环组不同点是用圆环形卡环的固位臂代替 I 杆。可用于

A 基牙舌向倾斜，颊侧无倒凹者； B 基牙向近中倾斜，颊侧远中无倒凹者；
C 基牙向远中倾斜，颊侧近中无倒凹者； D 口底过浅者；
E 前庭沟过浅或存在腭侧组织倒凹者

66. 桩核唇侧应为金瓷冠留出的间隙为

A 0.5mm; B 1.0mm; C 1.5mm; D 2.0mm; E 1.8mm.

67. 后腭杆位于

A 上颌硬区之前; B 上颌硬区; C 上颌硬区之后，颤动线之前;
D 颤动线; E 颤动线之后

68. 全口义齿试牙需检查的内容是

A. 咬合关系; B. 义齿的稳定和固位; C. 发音及面容协调;
D. 垂直距离; E. 以上都是

69. 固定桥修复的生理基础是

A 牙槽骨; B 牙周储备力及代偿功能; C 基牙代偿力
D 牙槽嵴粘膜 E. 以上都不对

70. 牙体缺损最常见的原因是

A 楔状缺损; B 龋病; C 牙外伤; D 磨损; E 发育畸形

71. 错牙合畸形的最佳矫治年龄为 ()

A 6~9岁; B 9~12岁; C 10~12岁; D 12~14岁;
E 视患者的具体情况而定

72. 以下那种矫治器不是功能性矫治器 ()

A 肌激动器; B edgewise 矫治器; C Fränkel
矫治器; D 双牙合垫矫治器; E Herbst 矫治器

73. 中度牙列拥挤指: ()

A 2~4mm; B 3~5mm; C 4mm<牙列拥挤度≤8mm;
D 8mm<牙列拥挤度≤10mm; E 2mm<牙列拥挤度≤5mm

74. Moyers 预测法是用 () 预测未萌出的上下颌尖牙与前磨牙的宽度。

A 上乳切牙宽度的总和; B 下乳切牙宽度的总和; C 上恒切牙宽度的总
和; D 下恒切牙宽度的总和; E 上下乳切牙宽度的总和

75. 咀嚼器官退化不平衡，其顺序为 ()

A 肌肉先，颌骨次之，牙齿再次之。
B 颌骨先，肌肉次之，牙齿再次之。
C 牙齿先，颌骨次之，肌肉再次之。

D 肌肉先，牙齿次之，颌骨再次之。

E 以上都不对

76. Bolton 指数前牙比是指()

A 上颌 4 个前牙牙冠宽度总和 / 下颌 4 个前牙牙冠宽度总和 $\times 100\%$

B 下颌 4 个前牙牙冠宽度总和 / 上颌 4 个前牙牙冠宽度总和 $\times 100\%$

C 上颌 6 个前牙牙冠宽度总和 / 下颌 6 个前牙牙冠宽度总和 $\times 100\%$

D 下颌 6 个前牙牙冠宽度总和 / 上颌 6 个前牙牙冠宽度总和 $\times 100\%$

77. 1-SN 测量值为 89, 1-SN 的正常值为 $105 \pm 6.3^\circ$, 表示()

A 上中切牙相对前颅底过唇倾.

B 上中切牙相对前颅底过舌倾.

C 上中切牙对于上颌过前突

D 上中切牙对于上颌过后缩

78. 下列哪种上颌牙齿萌出顺序最易引起上颌尖牙的唇向错位:

A 6、1、2、4、5、3、7; B 6、1、2、4、3、5、7

C 6、1、2、4、7、3、5; D 6、1、2、3、4、5、7

79. 在方丝弓矫治技术中需要弯制几个序列弯曲()

A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个 E. 6 个

80. 乳牙反牙合的最佳矫治时机是

A 2~3 岁; B 2~4 岁; C 3~5 岁; D 4~6 岁; E 6~8 岁

81. 某患者主诉上前牙拥挤, 前突, 口腔检查左侧磨牙远中牙合, 右侧磨牙中性牙合, 正确的诊断是

A 安氏 I 类错牙合; B 安氏 III1 错牙合; C 安氏 II2 错牙合;

D 安氏 III1 亚类错牙合; E 安氏 II2 亚类错牙合

82. 下列哪些公式对替牙间隙的解释是正确的?

A $V-5$ B $(IV+V) - (4+5)$

C $(III+IV+V) - (3+4+5)$ D $(II+III+IV+V) - (2+3+4+5)$

83. 以下牙槽骨破坏形式中治疗效果最好的为:

A 一壁骨袋; B 二壁骨袋; C 三壁骨袋; D 四壁骨袋

84. 深龋和慢性牙髓炎的主要鉴别点是:

A 刺激痛的强弱; B 有无自发痛史;

C 自发痛的剧烈程度; D 自发痛能否定位

85. 牙髓坏死的临床表现为 ()。
- A. 一般无症状, 但 X 线检查可见牙内吸收
 B. 牙齿发暗, 变色, 不透明, 温度及电活力试验无反应
 C. 牙齿变色, 髓腔内腐败发臭, 温度及电活力试验反应迟钝, 读数低于对照牙
 D. 无明显自发痛, 温度改变可引起疼痛
 E. 一般无症状, X 线可见根管有不均匀膨大
86. 需考虑外科正畸治疗的牙颌畸形是
- A 严重牙列拥挤; B 单纯正畸难以治疗的儿童严重骨性错牙合;
 C 单纯正畸难以治疗的成人严重骨性错牙合; D 上前牙严重唇倾的成人患者
87. 男, 20 岁, 右上 2 的舌侧窝呈囊状深陷, 变黑发软, 叩痛(-), 冷热诊无异常, 未穿髓其诊断和处理是:
- A 舌面点隙龋, 充填治疗; B 牙中牙, 间接盖髓;
 C 畸形舌侧窝伴深龋, 间接盖髓; D 畸形舌侧窝伴慢性牙髓炎, 根管治疗
88. 颌面部骨性支架由:
- A 12 块骨组成; B 10 块骨组成; C 14 块骨组成; D 16 块骨组成
89. 恒牙全口牙列中牙体和牙根最长的牙是:
- A 切牙; B 尖牙; C 前磨牙; D 磨牙
90. 颞下颌关节盘的最厚处是:
- A 前带; B 前伸部; C 中间带; D 后带
91. 下列属于浆液性腺的腺体是:
- A 下颌下腺; B 腮腺; C 舌下腺; D 唇腺
92. 下颌神经沟约相当于下颌磨牙咬合平面上方约:
- A 4cm; B 3cm; C 1cm; D 2cm
93. 引起妊娠期龈炎的病因是:
- A 内分泌改变; B 咬合创伤; C 妊娠本身; D 营养不良
94. 下列哪种牙周致病菌能够产生白细胞毒素:
- A 福赛坦氏菌; B 牙龈卟啉单胞菌; C 伴放线放线杆菌; D 具核梭杆菌
95. 妊娠期龈炎的优势致病菌为:
- A 溶血性链球菌; B 中间普氏菌; C 变形链球菌; D 螺旋体
96. 牙周病最重要的临床表现之一是:
- A 牙齿移位; B 牙周溢脓; C 口臭; D 牙周袋形成

97. 龈沟底在釉牙骨质界的根方，同时龈沟深度超过多少称为牙周袋：

A 2 mm； B 2.5 mm； C 3 mm； D 4 mm

98. 治疗牙龈炎首选方法：

A 选用漱口水，保持口腔卫生； B 去除牙石； C 牙龈切除； D 选用抗生素

99. 确定有牙槽骨吸收的标准是：

A 牙齿松动程度，Ⅱ度以上松动为有骨吸收；

B 牙周袋深度，大于 4mm 的牙周袋为有骨吸收；

C 牙槽嵴顶到釉牙本质界的距离，超过 2mm 可确定有骨吸收；

D X 线示牙周膜间隙透射区变宽；

100. 牙齿松动与下述哪项因素关系不大：

A 牙龈重度炎症； B 创伤； C 牙周韧带的急性炎症； D 女性激素水平变化

二、填空题（共 30 分，每空 1 分）

1. 口腔颌面部恶性肿瘤治疗的三大主要手段为：_____、_____、_____。

2. 口腔颌面部的特异性感染有_____、_____和_____。

3. 上颌骨在垂直空间上存在三个支柱，即_____，_____，_____。

4. 最常见的口腔癌是_____，其次是_____、_____。

5. 咽的神经支配来自_____，该丛由_____、_____及_____颈交感干咽支组成。

6. 目前研究证据充分的牙周致病菌为_____，_____，_____。

7. 最能客观反映牙周组织破坏程度的临床指标为_____。

8. 热凝树脂的充填应在_____期进行。

9. 桩核的直径应为牙根直径的_____。

10. 可摘局部义齿按义齿支持形式不同可分为_____，粘膜支持式，混合支持式

11. 全口排牙时上颌尖牙牙尖顶连线应置于切牙乳突中点_____ mm。

12. 选择活动义齿就位道的方法有_____和_____。

13. 楔状缺损的主要病因是_____、_____、_____和_____。

三、名词解释：（共 48 分，每题 8 分）

1. 根尖基点

2. 继发性合创伤

3. Honer 征

4. 腭咽闭合

5. 颊侧翼缘区

6. 前颅底平面

四、简答题（共 72 分，每题 12 分）

1. 简述深龋的治疗方法

2. 艾滋病在口腔的表现

3. 流行性腮腺炎与急性化脓性腮腺炎临床特点的鉴别诊断。

4. 简述颌骨骨折的治疗原则？

5. 请简述影响全口义齿固位的有关因素。

6. 简述 Angle 错牙合分类

五、问答题（共 50 分）

1. 试述如何在根管治疗中贯彻无菌观念及相应对策。（20 分）

2. 简述正颌外科的治疗程序与步骤。（15 分）

3. 如何鉴别诊断骨性前牙反牙合及功能性前牙反牙合？（15 分）