

# 青岛大学 2012 年硕士研究生入学考试试题

科目代码： 3 5 2 科目名称： 口腔综合（共 8 页）

请考生写明题号，将答案全部答在答题纸上，答在试卷上无效

## 一、单选题 40 分（每题 1 分×40 题）

- 1、 颈部骨折常伴有：  
A. 上颌骨骨折 B. 颧弓骨折 C. 下颌角区骨折  
D. 髁状突骨折 E. 下颌体骨折
- 2、 牙拔除后 2~4 天，出现拔牙创剧烈疼痛，最可能是：  
A 干槽症 B 牙槽突骨折 C 牙龈损伤  
D 牙槽窝内有异物 E 过高骨嵴和骨尖
- 3、 上颌骨骨折出现脑脊液鼻漏或耳漏时，下列哪种作法是错误的：  
A. 用消毒棉球填塞鼻腔和外耳道 B. 姿势引流 C. 用磺胺嘧啶或氯霉素预防感染 D. 耳鼻应该消毒并保持干净 E. 防止咳嗽和打喷嚏
- 4、 进行双侧唇裂手术的最佳时机：  
A. 出生后即可 B. 1-2 个月 C. 3-6 个月  
D. 6-12 个月 E. 1-2 岁
- 5、 以下哪项与混合瘤的临床表现不符：  
A. 可发生于任何年龄，以 30-50 岁多见。  
B. 一般呈圆形或椭圆形不规则状。  
C. 肿瘤质地硬，呈结节状  
D 肿瘤生长缓慢，多伴有疼痛  
E 较长发生于腮腺区
- 6、 下列哪项不是腺样囊性癌的特征：  
A. 好发于颌下腺和腮腺 B. 肿瘤沿神经血管束生长 C. 浸润性极强  
D. 区域淋巴结转移率低 E. 可带瘤生存
- 7、 幼儿的急性颌下淋巴结肿大大多由以下哪种疾病引起：  
A. 冠周炎 B. 牙髓炎 C. 牙周炎 D. 上呼吸道感染 E. 牙龈炎

- 8、以下关于腭裂的叙述哪项是错误的：
- A. 外科手术整复是主要的治疗方法
  - B. 应采用综合序列治疗来达到功能与形态的恢复
  - C. 腭裂手术无法建立“腭咽闭合”
  - D. 腭裂病人术后应作语音训练
  - E. 颌骨继发畸形的治疗常在 16 岁以后进行
- 9、颌骨骨折的重要治愈标准是：
- A. 骨性愈合
  - B. 纤维性愈合
  - C. 骨折线上的牙齿不松动
  - D. 恢复原有咬合关系
  - E. 无感染发生
- 10、下列唇裂整复术前准备中哪项是不需要的：
- A. 术前必须进行全面体检
  - B. 术前 3 天开始练习用汤匙或滴管喂饲流质或母乳
  - C. 术前 1 天做局部皮肤准备
  - D. 术前 3 天开始预防性服用抗生素
  - E. 术前 30 分钟注射东莨菪碱
- 11、上颌第一磨牙的斜嵴组成是：
- A. 近中颊尖三角嵴和远中舌尖三角嵴相连形成
  - B. 近中舌尖三角嵴和远中颊尖三角嵴相连形成
  - C. 近中舌尖和近中颊尖三角嵴相连形成
  - D. 近、远中舌尖三角嵴相连形成
  - E. 以上都不对
- 12、合平面的构成是由：
- A. 上颌所有后牙的颊尖相连构成
  - B. 下颌所有后牙的颊尖相连构成
  - C. 切点到下颌双侧第一磨牙相连
  - D. 由上中切牙近中切角到两侧上颌第一磨牙近中颊尖顶三点相连
  - E. 由上颌中切牙切缘和尖牙尖顶及双尖牙颊尖相连
- 13、在下颌隆突处，由前向后依次排列的神经是：
- A. 舌神经、颊神经、下牙槽神经
  - B. 下牙槽神经、颊神经、舌神经
  - C. 颊神经、舌神经、下牙槽神经
  - D. 下牙槽神经、舌神经、颊神经

- E. 舌神经、下牙槽神经、颊神经
- 14、唇的血液供应主要来自：  
A. 颌内动脉 B. 颌外动脉 C. 甲状腺上动脉 D. 舌动脉 E. 颈下动脉
- 15、关于咽旁间隙的描述中错误的是：  
A. 位于翼内肌、腮腺深叶及咽侧壁间 B. 分咽旁前间隙和咽旁后间隙  
C. 上达颅底，下至下颌下缘 D. 呈倒立锥体形  
E. 内有颈内动静脉及IX~XII脑神经。
- 16、多生牙的常见部位为：  
A. 侧切牙区 B. 前磨牙区 C. 下前牙区  
D. 上颌恒中切牙之间 E. 磨牙区
- 17、面角代表：  
A. 下颌的凸缩度 B. 面部的生长发育方向  
C. 上颌骨相对于颅骨的位置关系  
D. 上、下颌骨前部的相互位置关系 E. 面部的高度
- 18、常用于牙髓失活的药物是：  
A. 樟脑苯酚 B. 呋喃西林 C. 氯亚明 D. 多聚甲醛 E. 甲醛甲酚
- 19、无瘘型慢性根尖脓肿诊断的主要依据是：  
A. 牙冠变色 B. 龋洞已穿髓 C. 牙髓无活力  
D. 叩诊轻度不适 E. X线透射区边界模糊
- 20、FH平面是：  
A. Bolton点与鼻根点的连线 B. 耳点与眶点的连线  
C. 蝶鞍点与鼻根点的连线 D. 颅底点与鼻根点的连线  
E. 以上都不是
- 21、颌间支抗是指：  
A. 支抗牙与矫治牙在同一牙弓内，利用支抗牙作为支抗而使矫治牙移动  
B. 以枕部、颈部、头顶部等作为支抗进行牙移动  
C. 以上颌(上牙弓)或下颌(下牙弓)作为支抗来矫治对颌牙齿，或是调整颌位关系  
D. 利用种植体作为支抗来移动牙齿  
E. 以上均不正确

- 22、完全脱位牙实施再植术的最佳时间是：  
A 2h 之内 B 4h 之内 C 12h 之内 D 24h 之内 E 48h 之内
- 23、口腔粘膜盘状红斑狼疮的好发部位：  
A、硬腭粘膜 B、颊粘膜 C、唇红粘膜 D、舌背粘膜 E、牙龈粘膜
- 24、治疗唇部糜烂与脓血性痂皮时，首先应：  
A、做出临床诊断 B、做出病理诊断 C、检查血常规  
D、检测免疫功能 E、连续湿敷直至痂皮脱落
- 25、真性牙周袋的形成与哪项无关：  
A. 牙龈炎症 B. 牙龈增生或肿胀 C. 牙龈结缔组织的破坏  
D. 牙槽骨的吸收 E. 结合上皮向根方增殖
- 26、造成垂直型食物嵌塞的主要原因是  
A 牙周萎缩 B 牙齿松动 C 过度磨损  
D 接触点消失或异常 E 不良修复体
- 27、正中菱形舌位于：  
A、舌背中央 B、舌背人字沟前方  
C、舌背的中前区域 D、舌背中份或两侧 E、舌根部
- 28、龋病导致的牙体硬组织缺损，最常用的治疗方法是：  
A. 药物治疗 B. 针灸治疗 C. 充填治疗 D. 再钙化治疗 E. 自行修复
- 29、根管充填时填充长度应该是：  
A. 工作长度 B. 牙齿长度 C. X线片上的根管长度  
D. 根管长度 E. 髓腔长度
- 30、下列哪项不是牙髓的基本功能：  
A. 向牙髓牙本质复合体提供营养成分  
B. 牙本质细胞形成牙本质  
C. 有感觉神经纤维传导痛觉  
D. 成牙本质细胞及结缔组织成分对外界刺激的保护性反应  
E. 丰富的侧支循环使牙髓损伤后能很快恢复
- 31、感染根管内的主要细菌为：  
A. 梭形杆菌 B. 放线菌 C. 金黄色葡萄球菌 D. 厌氧菌 E. 真菌
- 32、下列哪项不是深龋的临床表现：

- A. 食物酸甜刺激痛 B. 牙髓活力正常 C. 冷热刺激痛  
D. 食物嵌塞痛 E. 自发性疼痛
- 33、临床上不易检查的继发龋或隐匿龋，可用下列哪种方法帮助诊断：  
A. X线 B. 麻醉法 C. 温度测验 D. 电活力测验 E. 探诊
- 34、最适用于检查隐裂的方法为：  
A. X片检查 B. 叩诊 C. 电活力测验法 D. 温度测验 E. 染色法
- 35、根管充填的时机：  
A 髓腔已完全清理，扩大成型 B. 无自发痛，叩诊无感觉  
C. 窦道口封闭 D. 无腐败臭味，根管内无脓血  
E. 以上全对
- 36、对于牙本质过敏，首选方法是：  
A. 药物脱敏 B. 牙髓治疗 C. 牙周治疗  
D. 牙周洁治 E. 树脂充填
- 37、急性牙髓炎的疼痛特点为：  
A. 冷热刺激痛，持续时间短暂，无自发痛  
B. 自发性痛，热刺激加剧，冷刺激痛减轻，疼痛能定位  
C. 自发性、阵发性夜间痛，疼痛呈放射状，疼痛不能定位  
D. 冷热刺激痛，刺激消除后，疼痛缓解  
E. 以上都不是
- 38、地图舌任何年龄均可发生，但多见于：  
A. 儿童 B. 青少年 C. 青年 D. 中年 E. 老年
- 39、口腔白色角化病与白斑的区别是：  
A、前者病因多为机械性刺激因素，后者则为物理化学因素  
B、前者损害呈灰白色，后者呈白色 C、前者损害大，后者小  
D、前者质软，后者质硬  
E、前者病理变化为单纯性的上皮增生，后者则为上皮异常增生
- 40、为预防四环素牙的发生，禁用四环素类药物：  
A、妊娠妇女，妊娠前半年内，授乳期间，学龄前儿童  
B、妊娠期妇女，分娩期间，授乳期间，7岁前婴幼儿  
C、妊娠期，分娩期，授乳期，生长发育期

- D、婴幼儿，青少年，成年，老年
- E、以上都对

## 二、多选题 10分（每题1分×10题）

1、颧骨颧弓骨折的临床体征是：

- A、局部凹陷 B、局部肿胀 C、张口受限 D、复视 E、咬合错乱

2、口腔颌面部特异性感染病原菌有：

- A. 铜绿假单胞菌 B. 结核杆菌 C. 放线菌
- D. 梅毒螺旋体 E. 厌氧菌

3、涎石病的临床表现正确的是：

- A. 进食时肿痛明显 B. 导管口可有脓液溢出 C. 常可扪及结石
- D. 可引起腺体继发感染 E. 通常并发其他部位结石

4、颈内静脉的属支包括以下：

- A. 甲状腺上静脉 B. 舌静脉 C. 面总静脉 D. 咽静脉 E. 锁骨下静脉

5、急性牙周脓肿的特征是：

- A. 急性发作 B. 位于牙齿唇颊侧或舌侧的牙龈上形成圆形的肿胀或突起
- C. 患牙有叩痛、松动、伸长，呈搏动性疼痛
- D. 伴有全身症状 E. 疼痛不定位

6、关于理想正常殆下列说法正确的是：

- A. 保存全副牙齿 B. 牙齿在上下牙弓上排列的很整齐
- C. 上下牙的尖窝关系完全正确 D. 上下牙弓的合关系非常理想
- E. 偶有轻微错殆畸形

7、恒牙正常咬合时下述关系何为正确：

- A. 上颌第一恒磨牙的近中舌尖咬触于下颌第一恒磨牙的中央窝
- B. 上颌第二前磨牙的舌尖咬触于下颌第一恒磨牙的近中窝上
- C. 上颌第一恒磨牙的远中颊尖咬触于下颌第一恒磨牙的颊沟上
- D. 下颌中切牙及上颌第三磨牙与对颌牙是1牙对1牙的接触关系
- E. 下颌尖牙咬触于上颌侧切牙与上尖牙之间

8、加强支抗的常用方法有：

- A. 增加用作支抗牙齿的数目
- B. 将点抗\_才连成整体增强支抗

- C. 增大活动矫治器的基托面积，保持与组织的密贴
- D. 利用横腭杆、Nance 弓、舌弓来增强支抗
- E. 加用口外唇弓颌外支抗、种植体支抗来增强支抗

9、增强桩核固位的方法包括：

- A. 尽可能保留残冠硬组织
- B. 尽可能利用根管长度
- C. 增加桩与管壁的密合度
- D. 根管预备成圆柱形
- E. 正确使用粘结剂

10、合创伤包括：

- A. 咬合时的过早接触
- B. 牙尖干扰
- C. 夜间磨牙，紧咬牙习惯
- D. 正畸治疗时加力不当
- E. 咬合力分布不均匀

### 三、填空题 20 分（每空 1 分×20 空）

1、下颌阻生智齿的情况复杂，术前必须对可能遇到的阻力仔细分析并制定解除阻力的方法，主要的三种阻力为\_\_\_\_\_阻力。

2、颌骨骨折的复位标准是\_\_\_\_\_。

3、口腔颌面部组织缺损和畸形包括\_\_\_\_\_。

4、唇部撕裂伤在进行清创缝合时应注意\_\_\_\_\_，才能保证唇部的外形美观。

5、舌癌主要治疗的三种手段\_\_\_\_\_。

6、穿过下颌孔的动脉分支是\_\_\_\_\_。

7、下颌神经出颅\_\_\_\_\_。

8、在上颌骨脸面、眶下缘中点下方椭圆形的孔称为\_\_\_\_\_。

9、固定桥修复后的基牙疼痛主要包括：\_\_\_\_\_、  
\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

10、牙周组织与牙髓组织之间存在以下交通途径：根尖孔，  
\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_。

11、慢性根尖周炎病变类型有  
\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

12、熟石膏调拌时的水粉比为\_\_\_\_\_，临床上在灌注石膏模型后  
\_\_\_\_\_小时可利用模型制作修复体。

13、Downs 分析法是以\_\_\_\_\_为基准平面。

#### 四. 名词解释 40 分 (每题 5 分×8 题)

- 1、种植外科的骨结合概念
- 2、下颌姿势位
- 3、腭咽闭合
- 4、个别正常殆
- 5、残髓炎
- 6、棘层松解
- 7、颤动线
- 8、沟内上皮

#### 五. 简答题 70 分 (每题 10 分×7 题)

- 1、下颌骨的薄弱部位
- 2、请述边缘性颌骨骨髓炎和中央性颌骨骨髓炎的鉴别要点
- 3、简述颈外动脉的主要分支
- 4、简述 Hellman 牙龄分期
- 5、简述 R P D 设计的基本要求
- 6、牙龈退缩常见原因
- 7、预备的基本原则

#### 六. 问答题 120 分 (每题 20 分×6 题)

- 1、试述沃辛瘤的临床特点
- 2、试述下颌下三角的境界及内容
- 3、龈缘炎的临床表现及治疗原则
- 4、何谓观测线? 根据卡环与观测线的关系, 试述卡环分类。
- 5、正畸早期矫治的原则及常用方法
- 6、疹样口疮与急性疱疹性龈口炎的鉴别