

杭 州 师 范 大 学

2012 年招收攻读硕士研究生入学考试题

考试科目代码： 308

考试科目名称： 护理综合

- 说明：1、命题时请按有关说明填写清楚、完整；
2、命题时试题不得超过周围边框；
3、考生答题时一律写在答题纸上，否则漏批责任自负；

一、单项选择题（每题 1.5 分，共 180 分。每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案）

- 1、护士指导病人留取痰液标本时，不正确的是：
A、最好清晨留取痰液标本 B、留取后及时送检
C、用力咳出呼吸道深处痰液 D、最后是在刷牙后留取痰标本
E、要注意防止唾液及上呼吸道分泌物污染
- 2、慢性阻塞性肺气肿最突出的症状是：
A、长期反复咳嗽 B、反复咳脓性痰 C、间歇少量咯血
D、逐渐加重的呼吸困难 E、活动后喘息
- 3、慢性肺心病患者急性加重期应慎用：
A、镇静剂 B、祛痰剂 C、解痉平喘药
D、呼吸兴奋剂 E、抗感染药物
- 4、吸气性呼吸困难的发生机制是：
A、上呼吸道狭窄 B、细小支气管狭窄 C、肺组织弹性减弱
D、麻醉药抑制呼吸中枢 E、呼吸面积减少
- 5、下列有关支气管哮喘临床特征的描述，最恰当的是：
A、局限性吸气性干啰音 B、反复发作的弥漫性呼气性干啰音
C、反复发作的吸气性干啰音 D、弥漫性吸气性干啰音
E、反复发作的局限性呼气性干啰音

6、患者，男性，40岁。发热、咳嗽、胸痛伴意识模糊半天。体格检查发现患者面色苍白，血压70/40mmHg，脉搏120次/分。实验室检查：白细胞计数 $16 \times 10^9/L$ ，中性分类85%。X线胸片：右上肺大片密度均匀阴影，该患者的诊断首先应考虑为：

- A、结核性胸膜炎 B、支气管扩张合并感染 C、支原体肺炎
D、休克性肺炎 E、肺脓肿

7、某男性病人，52岁，患COPD15年，近3天因急性上呼吸道感染病情加重，体温37.8℃，神志恍惚、昼睡夜醒，气促、不能平卧，痰色黄、粘稠，不易咳出。血气分析示 $PaO_2 56\text{mmHg}$ 、 $PaCO_2 67\text{mmHg}$ 。考虑此病人发生了：

- A、电解质紊乱 B、呼吸性酸中毒 C、脑疝先兆
D、肺性脑病 E、自发性气胸

8、某肺结核患者，突然出现喷射性大咯血，继而咯血突然中断，表情恐怖，大汗淋漓，此时首要的护理措施是：

- A、取半卧位 B、加压给氧 C、建立静脉通道
D、人工呼吸 E、清除呼吸道血块

9、可引起左心室前负荷过重的疾病是：

- A、高血压 B、主动脉瓣狭窄 C、二尖瓣关闭不全
D、肺动脉高压 E、肺动脉瓣狭窄

10、下列针对高血压患者的护理措施，错误的是：

- A、保持大便通畅 B、改变体位时动作宜缓慢
C、沐浴时水温不宜过高 D、头晕、恶心时协助其平卧位
E、协助用药尽快将血压降至较低水平

11、房颤病人主要应观察：

- A、P波的频率 B、P波的形态 C、血压的变化
D、心室率的改变 E、脉搏的改变

12、心力衰竭病人使用利尿剂时应特别注意：

- A、心率变化 B、血压变化 C、电解质变化
D、肾功能变化 E、肝功能变化

13、洋地黄药物治疗心衰患者，最危险的中毒表现是：

- A、食欲减退、恶心、呕吐 B、头痛、头晕，伴黄疸
C、心率减慢至每分钟60次 D、室性早搏呈二联律
E、二度房室传导阻滞呈文氏现象

- 14、患有高血压、动脉粥样硬化的老年患者，其饮食中不需限制的是：
A、高胆固醇食物 B、高动物脂肪食物 C、高糖食物
D、高钠食物 E、高钙食物
- 15、下列哪项心律失常采用机械兴奋迷走神经的方法可能终止发作：
A、频发室性期前收缩 B、房室传导阻滞 C、心房颤动
D、阵发性室上性心动过速 E、阵发性室性心动过速
- 16、慢性风湿性心脏病最常见的瓣膜病变为：
A、二尖瓣狭窄合并关闭不全 B、二尖瓣合并主动脉瓣 C、单纯主动脉瓣
D、主动脉瓣合并肺动脉瓣 E、肺动脉瓣合并三尖瓣
- 17、鼓励长期卧床的心力衰竭患者在床上做下肢活动，其目的主要是：
A、减少回心血量 B、预防压疮 C、防止肌肉萎缩
D、防止下肢静脉血栓形成 E、及早恢复体力
- 18、某冠心病患者，半月来频繁发作心前区不适，含服硝酸甘油无效，疑为急性心肌梗死。最具诊断意义的辅助检查是：
A、血常规 B、尿常规 C、血沉
D、超声波 E、心电图
- 19、胃肠钡餐造影检查需要禁食：
A、2h B、4h C、6h
D、8h E、12h
- 20、病人的呕吐物量大并伴有含酸性发酵宿食，见于：
A、慢性胃炎 B、幽门梗阻 C、急性胆囊炎
D、急性胰腺炎 E、慢性肠炎
- 21、在引起消化性溃疡的损害因素中，占主导地位的是：
A、胃酸-胃蛋白酶 B、幽门螺杆菌感染(Hp) C、非甾体类消炎药
D、饮食失调 E、精神因素
- 22、肝硬化病人最常见的并发症是：
A、上消化道出血 B、肝性脑病 C、原发性肝癌
D、肝肾综合征 E、电解质紊乱
- 23、肝性脑病患者暂停蛋白质饮食是为了：
A、减少氨的形成 B、减少氨的吸收 C、促使氨的转化
D、降低血尿素氮 E、降低肠道内 pH 值

24、急性胰腺炎上腹部剧痛的患者，护士应帮助其采取的体位为：

- A、仰卧位，头偏一侧 B、头高足低位 C、俯卧位
D、屈膝侧卧位 E、去枕平卧位

25、赵先生，患消化性溃疡 10 余年，饮酒 30 分钟后出现剧烈上腹部疼痛，诊断为急性胃穿孔，首要护理措施为：

- A、立即应用镇痛剂 B、立即输血 C、禁食和胃肠减压
D、安慰并陪伴病人 E、立即补液

26、某肝硬化患者，3 日未排便，出现嗜睡和幻觉，下列灌肠溶液中应除外：

- A、生理盐水 B、生理盐水+醋 C、肥皂水
D、清水 E、温水

27、急性肾盂肾炎最具特征性的尿液为：

- A、血尿 B、蛋白尿 C、脓尿
D、乳糜尿 E、脂质尿

28、下列哪项指标有助于贫血的鉴别和（或）疗效观察与评价：

- A、血红蛋白 B、红细胞计数 C、白细胞计数
D、网织红细胞 E、血小板计数

29、再障和急性白血病最主要的鉴别依据是：

- A、血小板计数 B、外周血出现幼红细胞 C、网织红细胞计数
D、外周血出现幼粒细胞 E、骨髓检查

30、有关铁剂治疗缺铁性贫血的叙述，不正确的是：

- A、症状纠正后继续服药 3~6 个月 B、网织红细胞数增加是治疗有效的指标
C、饭后服用 D、服药后可出现黑便
E、可防止缺铁性贫血的复发

31、急性白血病患者突然出现高热，主要原因为：

- A、出血 B、感染 C、正常红细胞减少
D、血小板减少 E、白血病细胞浸润

32、急性白血病患者化疗期间，由于大量白血病细胞被杀灭，血液尿酸浓度增高，一旦发生尿酸性结石时，护理人员可嘱患者：

- A、高蛋白饮食 B、服用利尿剂 C、多饮水
D、使用环磷酰胺 E、使用皮质激素

33、伴有出血倾向的血液病人出现下列哪项表现，要高度警惕颅内出血：

- A、高热 B、突发头痛 C、心悸气促
D、恶心呕吐 E、血压下降

34、甲亢的心血管系统特征性表现是：

- A、心悸气短 B、心律失常 C、睡眠时心率仍增快
D、心脏增大 E、心尖部第一心音亢进

35、符合甲状腺危象表现的是：

- A、体温 37℃ B、便秘 C、反应迟钝
D、颜面水肿 E、心率 140 次/分

36、抢救糖尿病酮症酸中毒首要的和关键的措施是：

- A、补液 B、防止诱因 C、使用小剂量胰岛素
D、纠正脑水肿 E、纠正电解质和酸碱平衡失调

37、糖尿病最常见的急性并发症是：

- A、神经病变 B、大血管病变 C、酮症酸中毒
D、高渗性非酮症昏迷 E、感染

38、胰岛素治疗过程中最常见的不良反应是：

- A、低血糖反应 B、过敏反应 C、注射部位脂肪萎缩
D、酮症酸中毒 E、胃肠道反应

39、诊断糖尿病的主要依据是：

- A、尿糖测定 B、血糖测定 C、OGTT 糖耐量试验
D、血浆胰岛素低于正常 E、糖化血红蛋白含量增高

40、下列不符合 SLE 临床特点的是：

- A、皮肤损害常见于暴露部位 B、肾脏损害多见 C、多数出现关节畸形
D、可出现抽搐 E、可有心肌炎

41、类风湿性关节炎急性期护理措施不妥的是：

- A、给予止痛消炎药 B、注意活动四肢 C、关节功能位
D、按摩 E、听音乐放松情绪

42、乙肝病人血清中检出抗-HBs (+)，说明：

- A、病情慢性变 B、已获得免疫力
C、仍有传染性，需继续隔离 D、病毒在体内复制
E、血清中肯定同时存在 HBsAg (+)

43、保护易感人群最重要的免疫措施是：

- A、接种疫苗、菌苗、类毒素
- B、注射高效免疫球蛋白
- C、口服中草药
- D、接种抗毒素
- E、注射丙种球蛋白

44、狂犬病的预防措施，错误的是：

- A、捕杀野犬
- B、病犬、病猫、病兽击毙深埋或焚烧
- C、正确处理被咬伤口
- D、被狂犬咬伤后接种狂犬疫苗
- E、易感人群应在未被咬伤前即应预防性接种狂犬疫苗

45、有关细菌性痢疾错误的是：

- A、急性病人里急后重明显
- B、典型粪便为粘液脓血便
- C、轻型腹部症状不明显
- D、病后免疫持久
- E、中毒型多见于2~7岁儿童

46、脑出血患者头部抬高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 是为了减轻：

- A、呼吸困难
- B、脑水肿
- C、呕吐
- D、头痛
- E、脑缺氧

47、脑出血患者最主要的死亡原因是：

- A、坠积性肺炎
- B、压疮感染
- C、脑疝
- D、溃疡大出血
- E、呼吸衰竭

48、沈某，男性，20岁，晨起发现自己左侧半身瘫痪，眼球震颤，共济失调，吞咽困难。该病人最可能是：

- A、脑血栓形成
- B、小脑出血
- C、蛛网膜下腔出血
- D、脑桥出血
- E、脑血管痉挛

49、患者女性，45岁，因腹痛伴呕吐1天入院。主诉乏力，口渴，尿量少且尿色黄；体检：眼窝凹陷、脉细速、血压90/60mmHg，尿比重1.018，血清钠浓度为142mmol/L。根据上述情况首先补充的液体是

- A、3%氯化钠溶液
- B、5%碳酸氢钠溶液
- C、5%葡萄糖溶液
- D、10%葡萄糖溶液
- E、平衡液

50、呼吸性酸中毒的主要发病机制是

- A、 H^+ 排出有障碍
- B、 H^+ 产生过多
- C、 CO_2 排出障碍
- D、 HCO_3^- 排出过多
- E、 K^+ 排出障碍

51、全身麻醉最严重的并发症是

- A、上呼吸道梗阻 B、低血压 C、高血压
D、心搏骤停 E、心律失常

52、术后病人早期呕吐的最常见原因是

- A、急性胃扩张 B、水、电解质紊乱 C、麻醉反应
D、急性肠梗阻 E、胃肠蠕动受抑制

53、控制破伤风病人痉挛的最主要措施是

- A、保持病室安静 B、限制亲友探视 C、使用镇静及解痉剂
D、护理措施要集中 E、静脉滴注破伤风抗毒素

54、肠内营养病人最常见的胃肠道并发症是

- A、恶心呕吐 B、腹胀 C、腹痛
D、便秘 E、腹泻

55、某休克病人进行快速输液中，监测得中心静脉压 $4\text{cmH}_2\text{O}$ ，BP80/60mmHg。应采取的措施是

- A、加快输液速度 B、减慢输液速度 C、暂停输液
D、减慢输液，加用强心剂 E、用升压药

56、患者男性，48岁，胃大部分切除手术后第4天，病人发热、伤口疼痛，检查见切口红肿，经治疗，红肿消退，术后第8天拆线，切口愈合良好。切口愈合记录为

- A、I/乙 B、II/乙 C、II/丙
D、III/甲 E、III/丙

57、强刺激抗癌药不慎漏入皮下，错误的护理是

- A、立即停止注药 B、利用原针头回抽 C、皮下注射解毒剂
D、局部热敷 E、局部封闭

58、患者女性，腰麻下行阑尾切除术，术后4h患者烦躁不安，主诉腹胀，测血压、脉搏、呼吸均正常，查体见：下腹部膨隆，叩诊浊音，首先考虑

- A、肠梗阻 B、急性胃扩张 C、腹腔内出血
D、急性腹膜炎 E、尿潴留

59、患者男性，42岁，经颈内静脉穿刺行中心静脉置管后，出现胸闷、胸痛、呼吸困难、同侧呼吸音减弱，首先考虑的并发症是

- A、气胸 B、血管损伤 C、胸导管损伤
D、空气栓塞 E、导管错位

60、患者女性，30岁，月经来潮期间出现乳房胀痛半年。两侧乳房内可触及多个大小不等、质地坚韧的结节状肿块，首先考虑的疾病是

- A、乳癌 B、乳房囊性增生病 C、乳房纤维瘤
D、乳管内乳头状瘤 E、乳房脂肪瘤

61、患者男性，28岁，8年来站立或腹压增高时反复出现右腹股沟肿物，平卧安静时肿块明显缩小或消失。10小时前因提重物而肿块又出现，伴腹痛、呕吐，肛门停止排气和排便；体检：右阴囊可见一梨状肿块，有触痛，平卧后肿块不消失。最有可能的诊断是

- A、嵌顿性腹股沟斜疝 B、嵌顿性腹股沟直疝 C、绞窄性股疝
D、睾丸鞘膜积液 E、睾丸扭转

62、患者男性，50岁，左上腹撞伤伴腹痛4小时，伤后曾呕吐1次，为少量胃内容物。体检：神志清，血压100/76mmHg，脉搏88次/分钟，上腹部有压痛、反跳痛及肌紧张，移动性浊音(-)。腹部平片示：膈下有游离气体。考虑最可能为

- A、腹壁挫伤 B、脾包膜下血肿 C、胰腺损伤
D、肝破裂 E、腹腔内空腔脏器破裂

63、患者女性，56岁。右上腹绞痛、发热、黄疸间歇性反复发作，最可能的诊断是

- A、胰头癌 B、急性传染性肝炎 C、肝癌
D、胆总管结石 E、阿米巴肝脓肿

64、患者男性，45岁，因肝癌行肝叶切除术后第一天，病人感腹痛、心慌、气促、出冷汗，血压下降，首先考虑

- A、胆汁性腹膜炎 B、肠梗阻 C、肝断面出血
D、膈下脓肿 E、肝性脑病

65、诊断早期胃癌的有效方法是

- A、胃液分析 B、纤维胃镜 C、X线钡餐造影
D、大便隐血试验 E、腹部B超检查

66、经皮肝穿刺胆道造影(PTC)术后容易发生的并发症是

- A、急性胰腺炎 B、气胸 C、内出血和腹膜炎
D、胆道出血 E、胆道感染

67、急性出血坏死性胰腺炎最常见的并发症是

- A、胆道感染 B、休克 C、急性肾功能衰竭
D、胰腺假性囊肿 E、胰腺脓肿

68、患者男性，71岁，因下腹隐痛，里急后重，解粘液脓血便三周来院诊治，医生行直肠指检，采用的检查体位是

- A、仰卧位 B、侧卧位 C、俯卧位
D、截石位 E、蹲位

69、病人平卧抬高下肢，排空静脉血，在大腿根部扎止血带阻断大隐静脉，然后让病人站立，10秒钟内放开止血带，若出现自上而下的静脉逆向充盈，提示

- A、交通静脉瓣膜功能异常 B、下肢深静脉通畅 C、小隐静脉瓣膜功能不全
D、大隐静脉瓣膜功能不全 E、下肢浅静脉通畅

70、慢性脓胸可出现的体征有

- A、肋间隙饱满 B、叩诊鼓音 C、支气管及纵隔偏向患侧
D、支气管及纵隔偏向健侧 E、下胸部叩诊过清音

71、患者男性，55岁，20年前曾患肺结核，近4个月来出现刺激性咳嗽，痰中带血丝，伴右侧胸痛、发热，X线片示右上肺4cm×5cm大小的阴影，边缘模糊，周围有毛刺。应考虑的诊断是

- A、肺结核 B、肺囊肿 C、肺良性肿瘤
D、肺脓疡 E、肺癌

72、食管癌病人出现持续性胸背痛多表示

- A、癌肿部位有炎症 B、癌肿已侵犯食管外组织 C、有远处血行转移
D、有食管气管瘘 E、侵犯喉返神经

73、体外循环术后的护理措施，**错误的是**

- A、病人回病房后立即吸氧 B、作好胸腔闭式引流的护理
C、严格无菌技术操作 D、若血压、脉搏平稳，即应取平卧位
E、密切观察和处理出血等并发症

74、患者男性，40岁，胸部外伤后出现呼吸困难、发绀、冷汗。体检：心率112次/分钟，血压70/45mmHg，气管向左偏移，颈部广泛皮下气肿，右侧胸廓饱满，叩诊鼓音，右肺呼吸音消失。最可能的诊断是

- A、损伤性血胸 B、肺挫裂伤 C、肋骨骨折
D、张力性气胸 E、创伤性窒息

75、患者男性，19岁，自发性气胸就医，置胸腔闭式引流，下地活动时不慎将引流管脱出，护士首要的处理是

- A、通知医师紧急处理 B、病人吸氧 C、嘱病人缓慢呼吸
D、将脱出的引流管重新置入 E、用手指捏闭引流口周围皮肤

76、患者男性，经常在持续高血压的基础上血压突然再升高，常表现为头痛、出汗、心动过速等；经各项检查，诊断为嗜铬细胞瘤，拟作手术治疗。术前护理措施中哪一项不恰当

- A、遵医嘱服降压药 B、心理护理 C、限制其活动范围
D、限制液体摄入 E、预防感染

77、患者男性，5岁，排尿过程中突然尿流中断，疼痛剧烈，改变体位后又可排尿，应考虑

- A、肾结石 B、输尿管结石 C、膀胱结石
D、后尿道结石 E、前尿道结石

78、前列腺摘除术后留置气囊尿管的主要目的是

- A、膀胱引流 B、膀胱冲洗 C、压迫前列腺窝，防止出血
D、防止感染 E、观察引流量

79、后尿道断裂血尿外渗的范围是

- A、腹腔内 B、会阴部皮下 C、会阴浅袋
D、盆腔腹膜外膀胱周围 E、阴囊内

80、下肢骨牵引的护理，错误的是

- A、抬高床尾30cm B、翻身时可放松牵引绳
C、观察患肢的血液循环 D、牵引重量不能触地 E、加强皮肤护理

81、骨折后期并发关节僵硬的主要原因是

- A、营养不良 B、神经损伤 C、废用性肌肉萎缩
D、缺少功能锻炼 E、关节内骨折

82、股骨颈骨折病人行人工全髋关节术后，患肢应采取的体位是

- A、外展内旋位 B、内收内旋位 C、内收外旋位
D、外展外旋位 E、外展中立位

83、对于腰椎间盘突出症首次发作的患者，首选的治疗和护理措施是

- A、局部封闭 B、绝对卧床休息 C、手术治疗
D、理疗 E、镇静止痛药

84、患者男性，68岁，诊断为脊髓型颈椎病，入院第二天行颈椎病前路手术，手术后病人出现呼吸困难的原因，**不包括**

- A、伤口出血 B、喉头水肿 C、术中损伤脊髓
D、术中损伤喉上神经 E、植骨块脱落

85. 以下描述中属于以人的健康为中心阶段的特点是
- A、建立以病人为中心的护理教育模式
 - B、系统化贯彻“护理程序”
 - C、按“护理程序”的工作方法对病人实施整体护理
 - D、护理方法是执行医嘱和护理常规
 - E、强调护理是一门专业
86. 某患者为毕业班老师，住院后每天批阅学生作业到很晚，此患者属于
- A、角色适应
 - B、角色行为冲突
 - C、角色行为强化
 - D、角色行为消退
 - E、角色行为缺如
87. 应激整体适应综合征的第一期是
- A.兴奋期
 - B.反应期
 - C.警觉期
 - D.抵抗期
 - E.耗竭期
88. 以下哪项患者的陈述需要护士采用澄清的方式
- A、我每天散步 30 分钟，约 1 公里路程
 - B、今天早上我的头不舒服
 - C、住院费用比我预算的多了 500 元
 - D、我每天用 50 克的食盐
 - E、我每天晚上 12 点还是睡不着，早上 3 点就醒来了
89. 下列有关护理诊断排序的说法正确的是
- A、对于某个病人来说，护理诊断的先后顺序应是固定不变的
 - B、现存的护理诊断一定排在有危险的护理诊断之前
 - C、一个病人的首优问题只有一个
 - D、护士可参照马斯洛需要层次学说排序
 - E、必须先解决首优问题，然后再解决中优问题
90. 普通病室最适宜的物理环境要求
- A、温度 18—22℃，湿度 50—60%，噪音强度 45—55dB
 - B、温度 22—24℃，湿度 50—60%，噪音强度 45—55dB
 - C、温度 18—22℃，湿度 40—50%，噪音强度 45—55dB
 - D、温度 22—24℃，湿度 40—50%，噪音强度 35—45dB
 - E、温度 18—22℃，湿度 50—60%，噪音强度 35—45dB
91. 下列消毒剂中，分别属于高效、中效消毒剂的是
- A、戊二醛 新洁尔灭
 - B、戊二醛 环氧乙烷
 - C、碘伏 环氧乙烷
 - D、过氧乙酸 乙醇
 - E、碘伏 乙醇

92. 以下关于医院感染说法正确的是

- A、出院后发病的病人不属医院感染的范畴 B、感染和发病应同时发生
C、一定是在病人住院期间遭受的感染 D、陪护者是医院感染的主要对象
E、只要在住院期间发生的感染就属于医院感染

93. 腰椎穿刺后 6 小时内让病人采取去枕仰卧位的目的是

- A、防止颅内出血 B、预防颅内高压
C、预防颅内压减低 D、预防颅内感染
E、防止脑缺血

94. 防止躁动不安患者坠床应使用

- A、床档 B、肩部约束带 C、膝部约束带
D、腕部约束带 E、踝部约束带

95. 对外科手术后疼痛，镇痛剂最好用在

- A、麻醉清醒前 B、麻醉清醒后 C、疼痛发作前
D、疼痛发作时 E、疼痛发作后

96. 为口腔铜绿假单胞菌感染的病人进行口腔护理时可选用的漱口液是

- A、1%~3%过氧化氢 B、2%~3%硼酸 C、1%~4%碳酸氢钠
D、0.02%呋喃西林 E、0.1%醋酸

97. 患者，王某，60 岁，全身麻醉后行“全胃切除术”。护士在使用平车搬运该患者时应该注意

- A、一个人搬运时平车紧靠床边 B、两人搬运时平车的头端和床尾呈钝角
C、三人搬运时，力气大的站床头 D、四人搬运时，分两组分别站在床两侧
E、推送患者时注意平车的大轮在前

98. 肝硬化严重腹水病人应给予

- A、无盐低钠饮食 B、低脂饮食 C、低蛋白饮食
D、高蛋白饮食 E、高热量饮食

99. 有关紫外线消毒下述描述正确的是

- A、空气消毒，每次照射时间一般为 15~20 分钟 B、物品消毒，有效距离为 2 米
C、消毒时间，需从灯亮 5~7 分钟后开始计时 D、灯管表面应定期用清水擦拭
E、室温越高，紫外线杀菌作用越强

100. 下列应执行保护性隔离的患者是

- A、细菌性痢疾 B、肺结核 C、肝移植
D、艾滋病 E、非典型性肺炎

101. 发热过程中，体温上升期的主要表现为

- A、体温升高，脉搏细速，四肢冰冷
B、体温升高，畏寒，皮肤潮红
C、体温升高，心率增快，出汗
D、寒战，皮肤潮湿，偶有脱水现象
E、体温升高，畏寒，皮肤苍白，干燥无汗

102. 尿毒症、糖尿病等引起的代谢性酸中毒患者，其呼吸经常表现为

- A、Cheyne-Stokes respiration
B、Biot's respiration
C、Strident respiration
D、Kussmaul's respiration
E、Stertorous respiration

103. 一氧化碳中毒患者缺氧的类型是

- A、低张性缺氧
B、循环性缺氧
C、组织性缺氧
D、血液性缺氧
E、呼吸性缺氧

104. 查找痰内癌细胞，标本可用乙醇固定，其浓度为

- A、25%
B、35%
C、50%
D、70%
E、95%

105. 下列因素中导致血压读数偏低的是

- A、被侧手臂位置高于心脏水平；袖带过松
B、放气太慢；袖带过紧
C、视线高于汞柱；袖带过紧
D、视线低于汞柱；被侧手臂位置低于心脏水平
E、患者刚爬上6楼；放气太快

106. 当平静吸气时，脉搏明显减弱甚至消失的现象称为

- A、水冲脉
B、绀脉
C、交替脉
D、奇脉
E、脱落脉

107. 阿米巴痢疾患者，留取大便标本的容器为

- A、蜡纸盒
B、玻璃皿
C、大试管
D、加温便器
E、塑料盒

108. 膀胱冲洗时，滴入的治疗药物须在膀胱内保留时间为

- A、10min
B、15min
C、20min
D、25min
E、30min

109. 成年女性导尿时，导尿管插入

- A、2~3cm
B、4~6cm
C、6~8cm
D、7~8cm
E、7~9cm

110. 臀大肌注射时患者侧卧的正确姿势是

- A、下腿伸直，上腿稍弯曲
B、两腿弯曲
C、上腿伸直，下腿稍弯曲
D、双膝向腹部弯曲
E、两腿伸直

111. 颈外静脉输液的穿刺点在

- A、下颌角和锁骨上缘中点连线上 1/3 处
- B、下颌角和锁骨上缘中点连线中 1/3 处
- C、下颌角和锁骨上缘中点连线下 1/3 处
- D、下颌角和锁骨下缘中点连线上 1/3 处
- E、下颌角和锁骨下缘中点连线下 1/3 处

112. 发生青霉素过敏性休克时，病人出现的呼吸系统症状是

- A、意识丧失
- B、血压下降
- C、面色苍白
- D、喉头水肿、气促
- E、幻觉、谵妄

113. 服后不宜立即饮水的是

- A、磺胺药物
- B、止咳糖浆
- C、酸剂、铁剂
- D、利尿剂
- E、抗生素

114. 因输液不慎，空气进入静脉，此时应立即采取

- A、右侧卧位
- B、左侧卧位
- C、仰卧中凹位
- D、头高足低位
- E、头低足高位

115. 对血液病患者尤为适用的是

- A、库存血
- B、新鲜血
- C、血尿
- D、成分血
- E、代血浆

116. 当大量使用保存期长的库血，会引起

- A、碱中毒，低血钠
- B、碱中毒，低血钾
- C、酸中毒，高血钾
- D、酸中毒，高血钠
- E、酸中毒，低血钾

117. 胸外心脏按压与人工呼吸比例应是

- A、1: 1
- B、5: 1
- C、10: 1
- D、15: 1
- E、15: 2

118. 临终患者最后消失的为

- A. 听觉
- B. 视觉
- C. 味觉
- D. 嗅觉
- E. 触觉

119. 以下关于临终关怀理念的叙述**错误**的是

- A、丰富患者生命，提高其生存质量
- B、采取积极措施帮助病人痊愈
- C、尊重临终患者的尊严和权利
- D、在照顾患者同时也为家属提供心理和社会支持
- E、是社会进步的一种表现形式

120. 临终病人开始接受自己患不治之症的事实，但抱有能治愈的希望，此期为

- A、协议期 B、接受期 C、否认期
D、愤怒期 E、忧郁期

二、多项选择题（每题 2 分，共 60 分。每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个以上的最佳答案，多选、漏选、错选不给分）

1、肺结核患者应采取下列哪些护理措施：

- A、绝对卧床休息 B、给予高热量、高蛋白、高维生素的食物
C、观察病情变化及药物不良反应 D、抗结核化学治疗期间均应住院隔离
E、加强心理护理，进行保健指导

2、呼吸衰竭患者为保持呼吸道通畅，可采取的护理措施为：

- A、应用祛痰剂 B、超声雾化吸入 C、气管切开
D、机械辅助通气 E、环甲膜穿刺

3、针对 COPD 患者的家庭氧疗措施，正确的是：

- A、吸氧浓度为 35%左右 B、一昼夜吸氧时间应超过 15h C、鼻导管给氧
D、氧疗目标为 SpO_2 达 90%以上 E、氧疗过程中监测血气分析

4、下列哪些情况下易发生洋地黄中毒：

- A、心肌缺血 B、低钾血症 C、肾功能减退
D、维持量给药 E、老年人

5、夜间阵发性呼吸困难的发作与下列哪些发病机制有关：

- A、静脉回心血量增加 B、平卧时膈肌上升，肺活量减少
C、夜间迷走神经兴奋性增高 D、熟睡时对缺氧更敏感
E、夜间机体耗氧量增加

6、慢性风湿性心脏病常见的并发症包括：

- A、心力衰竭 B、心房颤动 C、动脉栓塞
D、室壁膨胀瘤 E、亚急性感染性心内膜炎

7、为减轻腹泻患者的症状，其饮食要求为：

- A、少渣 B、低脂肪 C、高蛋白质
D、易消化 E、高热量

8、肝硬化大量腹水病人的护理措施，正确的是：

- A、给予半卧位 B、定期测量体重 C、放腹水后应缚腹带
D、给予低钾食物 E、避免骤然增加腹压的动作

9、肝性脑病前驱期临床表现为：

- A、性格改变 B、扑翼样震颤 C、肌张力增高
D、行为异常 E、睡眠障碍

10、导致血液病人死亡的主要原因包括：

- A、贫血 B、颅内出血 C、败血病
D、全身衰竭 E、发热

11、酮症酸中毒的诱因包括：

- A、感染 B、饮食不当 C、创伤
D、手术、妊娠 E、¹³¹I 治疗不当

12、护理急性脑出血病人应注意预防：

- A、呼吸道感染 B、脑疝 C、应激性溃疡
D、压疮 E、心力衰竭

13、休克代偿期的症状是

- A、尿量减少 B、皮肤粘膜紫绀 C、收缩压正常，脉压缩小
D、意识模糊 E、烦躁不安

14、Beck三联征是指

- A、呼吸困难 B、心律失常 C、血压降低，脉压小
D 中心静脉压升高 E 心音遥远，脉搏微弱

15、移植后不会发生排斥反应的是

- A、异种移植 B、异种联合移植 C、同质移植
D、同种异体移植 E、断肢再植

16、瘢痕性幽门梗阻患者术前的特殊准备是

- A、备皮、配血 B、术前 3d 每晚洗胃 C、药物过敏试验
D、纠正代谢性碱中毒 E、心理护理

17、病人女性，25岁。甲状腺大部切除术后返回病房，病人声音嘶哑，饮水易出现呛咳，可能的并发症是

- A、一侧喉返神经损伤 B、喉上神经内支损伤 C、喉上神经外支损伤
D、双侧喉返神经损伤 E、甲状旁腺损伤

18、下列胆道检查前需作碘过敏试验的是

- A、CT B、B 型超声波 C、静脉胆道造影
D、ERCP E、PTC

19、肛门坐浴的目的包括

- A、促进排便反应 B、促进炎症吸收 C、消除局部分泌物
D、改善局部血液循环 E、使肛门括约肌放松

20. 腹膜炎病人采用半卧位，其目的包括

- A. 有利于脓液积聚于盆腔 B. 有利于呼吸和循环
C. 有利于炎症局限及引流 D. 促进胃肠道功能恢复
E. 防止膈下感染

21. 关于泌尿系统结石病人的护理正确的是

- A. 卧床休息 B. 多饮水 C. 注意饮食调节
D. 适当运动 E. 控制水分摄入

22. 护理的发展阶段经历了

- A、以家庭为中心 B、以疾病为中心 C、以患者为中心
D、以健康为中心 E、以社会为中心

23. 下列属于阻碍有效沟通的行为是

- A、改变话题 B、主观判断 C、核实
D、多说安慰话，如“你一定会好的。” E、尽快下结论

24. 患者朱某，因颈椎骨折入院，在对其进行搬运的过程中，应注意

- A、可采用三人搬运法 B、可采用四人搬运法
C、保持头部处于中立位 D、上下坡时，患者头部应位于低处
E、头颈两侧用衣物或沙袋加以固定

25. 如病人不慎咬破体温计，正确的做法是

- A、立即洗胃 B、立即清除玻璃碎屑
C、饮大量蛋清液或牛奶 D、饮大量生理盐水，卧床休息
E、病情允许下服用富含膳食纤维的食物

26. 下列属于晶体溶液的是

- A、5%~10%葡萄糖溶液 B、复方氯化钠溶液 C、4%碳酸氢钠
D、706代血浆 E、低分子右旋糖酐

27. 判断心脏骤停的主要标准是

- A、意识丧失 B、呼吸停止 C、心电图呈直线
D、颈动脉搏动消失 E、心音消失

28. 以下属于洗胃禁忌症的有

- A、强酸中毒
- B、肝硬化伴食道静脉曲张
- C、重金属中毒
- D、胃癌
- E、胃穿孔

29. 死亡后 1-4 小时内可出现的尸体现象是

- A、尸冷
- B、尸斑
- C、尸僵
- D、尸腐
- E、尸绿

30. 下列关于医疗和护理文件记录书写叙述正确的为

- A. 抢救结束后 6h 内完成完整的记录
- B. 书写有错误时，应该用修正液修改
- C. 记录内容更应该尽量简洁
- D. 记录中应避免记录患者的主观资料
- E. 新增一页记录单时，眉栏必须逐项填写完整

三、问答题（每题 20 分，共 60 分）

（一）患者女性，45 岁，扁桃体炎反复发作 10 余年。3 年前体检时发现尿蛋白(++)，镜下血尿 3/HP。无明显高血压、水肿等症状，肾功能检查正常。诊断为“急性肾小球肾炎”，给予卧床休息、预防感染、对症支持治疗后好转。近 1 月来感全身乏力，胃纳明显下降，咽喉部肿痛，尿量减少，来院就诊。

护理体检：T 37.5℃ P 87 次/分 R 19 次/分 BP160/110mmHg 神志清，精神尚可，贫血貌，颜面轻度浮肿，胸腹部检查(-)，双下肢中度凹陷性水肿，神经系统检查(-)。

实验室检查：血液检查 WBC 6.5×10^9 /L N70% L30% Hb 100g/L

尿液检查 蛋白(++) 颗粒管形 3/HP

肾功能检查 Cr250 μ mol/L BUN18 mmol/L GFR30ml/min

请根据以上提供的资料，回答下列问题：

- 1、作出该病例的初步医疗诊断。
- 2、为明确诊断，需补充哪些辅助检查？
- 3、提出 2 个主要的护理诊断和相关因素，制定相应的护理措施。

(二) 病历摘要：李先生，43 岁，2 小时前骑自行车被汽车撞倒，头部着地，当即昏迷约 10 分钟，醒后诉头痛，在转送过程中再次昏迷，并呕吐胃内容物 2 次。体格检查：体温 37℃，呼吸 12 次/分，脉搏 62 次/分，血压 130/70mmHg。意识不清，针刺肢体能睁眼并有肢体伸直动作，回答问题有音无语。右颞部头皮触及 4cm×5cm 血肿，右耳后乳突区有瘀斑，右侧瞳孔直径约 3.5mm，对光反应迟钝，左侧瞳孔直径 2mm，对光反应正常。右耳道流淡血性液体，嘴角向左侧歪。左侧肢体瘫痪、肌张力稍增高、腱反射亢进，病理反射阳性。CT 检查结果：右颞部硬脑膜外血肿、颅底骨折。经积极准备后手术治疗。

请回答：

1. 病人到医院时，意识障碍按 Glasgow 评分为几分？
2. 该病人手术前应做好哪些护理？
3. 该病人因颅底骨折存在“有感染的危险 与脑脊液外漏有关”，请制定相应的护理目标和护理措施。

(三) 病人×××，女，截瘫，卧床两个月，小便失禁。现骶尾部皮肤有约 5×5(cm²) 大小呈紫红色，且表面有一较大水泡，局部软组织肿胀、发硬，疼痛明显。请分析回答：此病人出现了什么问题？针对此患者目前状况，你将如何护理？