

# 苏州大学

## 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称: 护理学

考试科目: 护理综合(B卷)

### 一、单选题(占 60%, 180 分, 每题 1、5 分, 120 道题)

- 下列不属于护士的角色范畴的是  
A、健康教育者 B、治疗护理计划者  
C、病人利益维护者 D、健康咨询者
- 下列护理目标中, 描述不正确的一项是  
A、出院前病人学会自己注射胰岛素 B、住院期间病人体重保持在 60 公斤以内  
C、住院期间病人增强体质 D、1W 周后病人独自行走 50m
- 护理措施的类型不包括  
A、依赖性的 B、独立的 C、相互依赖的 D、治疗性的
- 慢性病人宜采用的护患关系模式是  
A、主动-被动型 B、共同参与型 C、指导-合作型 D、以上都不是
- “入乡随俗”是人类哪一层面的适应  
A、生理 B、心理 C、技术 D、社会文化
- 莱宁格的“跨文化护理理论”认为, 护理的本质是  
A、治病 B、文化关怀 C、教育 D、伦理
- 护理质量评价中以护士运用护理程序的规范行为为标准, 该评价属于  
A、结构评价 B、结果评价 C、过程评价 D、护理评价
- 护理人员所面临的诸多人际关系中, 最重要的关系是  
A、医患关系 B、护患关系 C、护际关系 D、护技关系
- 向多个社区提供全面、持续的医疗、护理等服务的卫生机构称  
A、一级医院 B、三级医院 C、二级医院 D、四级医院
- 在压力源的刺激下, 机体出现一系列以交感神经兴奋为主的改变, 这属于压力反应的哪个阶段  
A、反应期 B、抵抗期 C、衰竭期 D、警告期
- 整体护理的指导思想是:  
A、以问题为本 B、以护理对象的心理需求为本  
C、以护理对象的生理需求为本 D、以人为本
- 护理理念的基本要素是:  
A、个人、家庭、社区、社会 B、人、健康、环境、护理  
C、健康、疾病、环境、护理 D、人、健康、疾病、护理
- 依据纽曼模式, 第三级预防保健护理的重点是:  
A、早期发现病例 B、早期治疗 C、控制或改变压力源  
D、帮助护理对象恢复和重建功能, 防止压力源的进一步损害
- 人是一个什么系统?  
A、人造开放系统 B、人造封闭系统 C、自然封闭系统 D、自然开放系统
- 属于客观方面的健康资料是:

第 1 页共 11 页

注意: 答案请不要做在试题纸上  
试卷编号: 308

- A、疼痛 B、愉快 C、水肿 D、乏力
- 新生儿病室的温度最好控制在  
A、18-20℃ B、20-22℃ C、22-24℃ D、24-26℃
- REM sleep 不出现什么情况  
A、心率增快 B、分泌生长激素 C、眼球转动 D、做梦
- 留取 12h 的尿标本的方法是  
A、于 7am 排空膀胱后开始留取尿液至 7am  
B、于 7pm 排空膀胱后开始留取尿液至次晨 7am  
C、于 7am 所排尿液开始留取至 7am  
D、于 7pm 所排尿液开始留取尿液至次晨 7am
- 患者肢体能移动位置但不能抬起时的肌力为  
A、2 级 B、3 级 C、4 级 D、5 级
- 紫外线消毒时注意事项中, 下列哪项应除外  
A、清洁灯管 B、消毒时间应从灯亮后 3-5min 后计时  
C、消毒时适用湿度为 40-60% D、灯管照射强度 $>60\text{uW}/\text{cm}^2$
- 下列哪项是中危物品  
A、透析器 B、呼吸道内镜 C、病员衣服 D、脏器移植
- 属于消化道隔离的疾病是  
A、甲型肝炎 B、腮腺炎 C、破伤风 D、流行性出血热
- 弛张热的特点为  
A、体温 38-39℃ B、日温差在 1℃以上 C、持续数天或数周 D、见于肺炎
- 呼吸系统疾病常会导致下列哪个缺氧  
A、低张性缺氧 B、血液性缺氧 C、循环性缺氧 D、组织性缺氧
- 皮内注射是指将药液注入  
A、表皮与真皮之间 B、皮下组织 C、真皮内 D、脂肪组织
- 一患者需输入 2000ml 液体, 每分钟滴速为 40 滴, 所用输液器的点滴系数为 15, 试问需用多长时间输完?  
A、10 h B、12.5 h C、15 h D、17.5 h
- 严重感染时最好输入下列哪项血制品  
A、洗涤红细胞 B、浓缩红细胞 C、新鲜血 D、纤维球蛋白
- 如果患者两次体温差异较大或与病情不符, 重测相符者在原体温符号上方写上小写英文字母  
A、m B、r C、v D、w
- 患者处于持续睡眠状态, 但能被唤醒, 思维和语言不连贯, 对时间、地点、人物的定向力完全或部分发生障碍, 有错觉、谵语, 属于  
A、嗜睡 B、意识模糊 C、昏睡 D、昏迷
- 为休克病人安置卧位时, 头胸部和下肢应分别抬高的角度是  
A、10-20°, 10-20° B、20-30°, 10-20°  
C、10-20°, 20-30° D、30°-40°, 30°-40°
- 根据 WHO 推荐的三阶梯疗法, 对中度疼痛的患者宜采用的止痛药物是  
A、阿司匹林 B、可待因 C、吗啡 D、地西泮
- 下列对淤血红润期压疮的描述, 哪项是错误的:

第 2 页共 11 页

注意: 答案请不要做在试题纸上  
试卷编号: 308

- A、此期皮肤的完整性未破坏，是可逆性改变  
B、局部皮肤出现红、肿、热痛或麻木  
C、护理重点是保护皮肤，防止感染的发生  
D、解除该部位压力 30 分钟后，皮肤颜色不能恢复正常
- 33、下列哪项情况下禁忌热疗：  
A、炎症早期                      B、年老体弱患者  
C、炎症后期                      D、软组织损伤早期
- 34、低热患者宜采用的饮食是：  
A、营养平衡，美观可口，无刺激的一般饮食，每日三餐，各餐按比例分配  
B、食物呈半流，无刺激性，易吞咽和消化，每日 5-6 餐  
C、易消化、咀嚼，食物碎、烂、软，少油腻，少粗纤维，每日 3-4 餐  
D、食物呈液体状，易消化和吞咽，每 2~3h 一次，每日 6-7 餐
- 35、下列对尿失禁病人的护理，哪项不妥  
A、注意保持皮肤清洁、干燥，减少饮水量<1000ml/日，避免尿液浸渍会阴部  
B、指导患者进行骨盆底部肌肉的锻炼，增强控制排尿的能力  
C、尊重、理解患者，给予安慰、开导和鼓励，维护病人自尊  
D、必要时应用接尿装置引流尿液，注意保护会阴部皮肤
- 36、对头、颈部有损伤的呼吸、心跳骤停病人实行心肺复苏时，下列哪项是错误的：  
A、让患者仰卧于硬板床或地上  
B、解开衣领口、领带、围巾和腰带，清除口腔内异物  
C、抢救者采用仰头抬颈法开放气道  
D、深吸一口气，屏气，双唇包住患者口唇，用力吹气，使胸廓扩张
- 37、指导慢性阻塞性肺气肿病人做腹式呼吸时，下列哪项是错误的  
A、用口吸气，用鼻呼气    B、两手分别放于前胸部和上腹部  
C、可在腹部放置小枕头、杂志    D、只能在疾病恢复期进行
- 38、慢性肺心病长期氧疗，每日持续吸氧时间应超过  
A、6h    B、9h    C、12h    D、15h
- 39、肺炎链球菌肺炎治疗首选  
A、头孢菌素    B、青霉素 G    C、红霉素    D、林可霉素
- 40、控制哮喘发作的首选药物是  
A、 $\beta_2$ 受体激动剂    B、糖皮质激素    C、抗胆碱能药物    D、茶碱类
- 41、判断肺结核病人有无传染性，最重要的依据是  
A、痰中带血                      B、X线检查示病灶有空洞  
C、结核菌素试验阳性    D、痰结核菌检查阳性
- 42、自发性气胸经胸腔闭式引流无气体溢出 1~2 天后，夹管观察多长时间，如肺已全部复张便可拔管  
A、18h    B、24h    C、36h    D、48h
- 43、29 岁女士，患支气管扩张 10 年，咳嗽、咳脓性痰，痰量 50ml/d，下列处理不当的是  
A、体位引流    B、加强营养    C、长期应用抗生素    D、给予祛痰剂
- 44、最有效的终止房扑的方法是  
A、洋地黄静注    B、胺碘酮静注    C、同步直流电复律    D、非同步直流电复律
- 45、二尖瓣狭窄的病人最易出现的心律失常是

第 3 页共 11 页

注意：答案请不要做在试题纸上  
试卷编号：308

- A、室早    B、室速    C、房早    D、房颤
- 46、李先生，心脏病，长期服用地高辛，护士在每次发药时特别要注意的是  
A、核对病人的床号、姓名                      B、叮嘱病人在饭后服药  
C、服药前仔细测量病人的脉搏    D、注意发药到口
- 47、急性心肌梗死患者发生便秘时，首先应采取的措施是  
A、温热肥皂水低压灌肠    B、给缓泻剂    C、给硫酸镁口服导泻    D、协助患者床上排便
- 48、患者女性，64 岁，血压 180/110mmHg，血胆固醇 5.6mmol/L，属于高血压  
A、2 级高危    B、2 级极高危    C、3 级高危    D、3 级极高危
- 49、适宜冠心病患者的饮食是  
A、高热量，低胆固醇                      B、高热量，低蛋白  
C、低热量，低盐，高胆固醇    D、低胆固醇，低盐
- 50、心绞痛发作的首要护理措施是  
A、立刻描记心电图                      B、给予吸氧  
C、让病人安静坐下或半卧    D、建立静脉通路
- 51、肝硬化最常见的并发症是  
A、肝性脑病    B、感染    C、上消化道出血    D、原发性肝癌
- 52、男性，40 岁，可疑原发性肝癌，最有助于诊断的化验是  
A、癌胚抗原测定    B、碱性磷酸酶测定    C、甲胎蛋白测定    D、异常凝血酶原测定
- 53、患者，男性，肝硬化病史 10 年，现出现衣冠不整，随地便溺，扑翼样震颤(+)，脑电图正常，属肝性脑病  
A、前驱期    B、昏迷前期    C、昏睡期    D、昏迷期
- 54、提示消化性溃疡急性穿孔最有价值的体征是  
A、上腹痛加剧    B、腹肌紧张    C、疼痛节律性消失    D、肝浊音界消失
- 55、慢性浅表性胃炎最主要的病因是  
A、幽门螺杆菌感染    B、高盐饮食，缺乏蔬菜水果  
C、服用大量 NSAID    D、自身免疫
- 56、幽门螺杆菌根除治疗后复查的首选方法是  
A、快速尿素酶测定    B、幽门螺杆菌培养  
C、尿素呼气试验    D、粪便幽门螺杆菌抗原检测
- 57、下列有关消化性溃疡的用药护理正确的是  
A、抗酸药应在饭前 1h 和睡前服用    B、硫糖铝片宜在饭后 1h 服用  
C、氢氧化铝凝胶应避免与奶制品同时服用  
D、H<sub>2</sub>受体拮抗剂应在餐前服用
- 58、患者男性，47 岁，中午饱餐后 1h 突然出现中上腹部剧烈的刀割样疼痛，且向腰背部放射，继而呕出胆汁，伴高热、面色苍白，急症时全腹疼痛，腹肌强直，紧急治疗措施为  
A、胃肠减压    B、手术治疗    C、静脉输液    D、解痉、止痛
- 59、某男性疑为急性胰腺炎，但病程已超过 6 日，此时最具诊断价值的实验室检查为  
A、白细胞计数    B、血清淀粉酶测定    C、血清脂肪酶测定    D、C 反应蛋白测定
- 60、在护理肾功能衰竭病人时，护士最重要的责任是  
A、检查每日化验值                      B、记录出入量  
C、限制每日入水量低于 1000ml    D、每日量体重
- 61、下列哪项不是肾盂肾炎常见的诱发因素

第 4 页共 11 页

注意：答案请不要做在试题纸上  
试卷编号：308

- A、肾小球肾炎 B、糖尿病 C、前列腺肥大 D、导尿
- 62、患者男性，50 岁，肾小球肌酐清除率减少至 20ml/min，血肌酐 600μmol/L，夜尿增多，水、电解质紊乱，此病人肾功能不全的分期为
- A、肾储备能力下降期 B、氮质血症期 C、肾衰竭期 D、尿毒症期
- 63、慢性肾功能衰竭时，最常最早出现的症状是
- A、贫血 B、食欲不振 C、皮肤瘙痒 D、肢体麻木，感觉异常
- 64、腹膜透析的主要并发症为
- A、水电解质紊乱 B、腹膜炎 C、心力衰竭 D、腹痛
- 65、患者女性，68 岁，近一个月来厌食，皮肤瘙痒。查尿蛋白(+++)，血 Cr 820μmol/L，诊断为慢性肾功能不全尿毒症期。护士对其皮肤瘙痒的护理措施错误的是
- A、用温水擦洗皮肤 B、洗澡后涂抹润肤霜
- C、用碱性强的肥皂彻底清洗皮肤 D、勤换内衣
- 66、特发性血小板减少性紫癜病人的最重要护理措施是观察和预防
- A、胃肠道出血 B、脑出血 C、鼻出血 D、尿道出血
- 67、最常见的引起继发性再生障碍性贫血的药物为
- A、磺胺药 B、氯霉素 C、四环素 D、保泰松
- 68、血小板测定常低于下列哪个值时，临床应警惕颅内出血
- A、 $40 \times 10^9/L$  B、 $30 \times 10^9/L$  C、 $20 \times 10^9/L$  D、 $10 \times 10^9/L$
- 69、容易引起出血性膀胱炎而导致血尿的化疗药物是
- A、甲氨喋呤 B、长春新碱 C、环磷酰胺 D、阿糖胞苷
- 70、缺铁性贫血的细胞形态学表现为
- A、小细胞正色素性贫血 B、小细胞低色素性贫血
- C、大细胞正色素性贫血 D、大细胞低色素性贫血
- 71、女性，28 岁，甲状腺功能亢进病史半年，妊娠 3 个月，甲状腺功能亢进症状加重，治疗首选
- A、甲巯咪唑 B、卡比马唑 C、甲基硫氧嘧啶 D、丙基硫氧嘧啶
- 72、有关糖尿病病人应用胰岛素治疗，哪项不正确
- A、胰岛素应冷藏保藏 B、先抽吸长效胰岛素，再抽吸短效胰岛素
- C、经常更换注射部位 D、短效胰岛素饭前半 h 皮下注射
- 73、糖尿病患者，女性，46 岁，近 1 周因急性菌痢后全身乏力，食欲不振，恶心、呕吐，呼吸深大且有烂苹果味，继而头痛、嗜睡、进入昏迷，此时首要的治疗措施应为
- A、吸氧 B、输液 C、纠正电解质和酸碱平衡紊乱 D、应用抗生素
- 74、某女病人手足小关节痛已 5 年，查体见双手手指间肌肉萎缩，手指向尺侧偏斜，X 线检查示关节腔变窄，关节半脱位，应考虑
- A、类风湿性关节炎 B、系统性红斑狼疮
- C、风湿性关节炎 D、骨关节炎
- 75、脑出血病人出现脑疝症状，护士在通知医生的同时
- A、快速静脉滴入甘露醇 B、吸氧 C、头部抬高 D、准备气管切开包
- 76、护理频繁呕吐伴有突然头痛的患者时，发现其意识不清，脉搏、呼吸减慢，左右瞳孔不等大，应考虑
- A、脑疝形成 B、脑血栓形成 C、高血压危象 D、蛛网膜下腔出血
- 77、原因不明的癫痫强直-阵挛发作首选

第 5 页共 11 页

注意：答案请不要做在试题纸上  
试卷编号：308

- A、苯妥英钠 B、卡马西平 C、丙戊酸钠 D、乙琥胺
- 78、下列有关脑梗死急性期的治疗错误的是
- A、早期溶栓 B、尽早应用血管扩张剂降血压
- C、防治脑水肿 D、高压氧舱治疗
- 79、脑栓塞的主要特征是
- A、多有明显诱因 B、活动中发病 C、起病急骤 D、偏瘫、失语
- 80、患者，女，10 岁，突发寒战、高热、抽搐、昏迷，体检：T 40、5℃，血压 60/30mmHg，肛拭子取便，镜检：脓细胞(+)，拟诊为细菌性痢疾。为确诊应做下列哪项检查
- A、血培养 B、大便培养 C、脑脊液检查 D、血清抗体检测
- 81、流行性乙型脑炎最主要的传染源是
- A、蚊 B、跳蚤 C、老鼠 D、猪
- 82、确定一种传染病的隔离期是根据
- A、病程 B、潜伏期 C、传染期 D、前驱期
- 83、下列属于乙类传染病的是
- A、霍乱 B、传染性非典型肺炎 C、斑疹伤寒 D、麻风
- 84、治疗有机磷农药中毒所致的急性肺水肿，最有效的药物是
- A、西地兰 B、氨茶碱 C、阿托品 D、速尿
- 85、急性肠梗阻病人大量呕吐后，脉搏细速，血压下降，可能是出现了低血钾，可引起
- A、低渗性脱水 B、等渗性脱水 C、高渗性脱水 D、高钠血症
- 86、低钾血症最早的表现是：
- A、腹胀 B、心率加快 C、肌肉无力 D、心律失常
- 87、治疗重度低渗性脱水的病人，首先应输入的液体是：
- A、5%葡萄糖盐水 B、平衡盐溶液 C、复方氯化钠溶液 D、3%氯化钠溶液
- 88、下列关于休克的描述，哪项是正确的
- A、当血容量丧失未超过 25%，机体处于代偿阶段
- B、休克早期易发生呼吸性酸中毒，应及时使用 5%碳酸氢钠溶液
- C、休克持续 10h 以上，易继发内脏器官的损害
- D、酸中毒时血红蛋白氧离曲线左移，氧不易从血红蛋白释放
- 89、中心静脉压低，血压正常时，处理原则为
- A、充分补液 B、适当补液 C、补液试验 D、舒张血管
- 90、出血性休克补液治疗中，显示成功的最好临床指标是：
- A、口渴减轻 B、动脉血氧分压上升 C、脉搏减慢 D、尿量增加
- 91、破伤风最早发生紧张性收缩的肌群是：
- A、面肌 B、咀嚼肌 C、颈背肌 D、四肢肌群
- 92、患儿，2 岁，体重 15kg，在家玩耍时不慎打翻开水瓶，双下肢被开水烫伤后皮肤出现大水疱、疼痛明显，水疱破裂后创面为红色。该患儿的烧伤深度为
- A、Ⅰ度 B、浅Ⅱ度 C、深Ⅱ度 D、Ⅲ度
- 93、手术区皮肤准备的时间下列哪项是正确的
- A、手术前 24h B、手术前 12h C、手术前 6h D、手术前 2h
- 94、切口感染表现，下列哪项有错
- A、术后 24h 内高热 B、切口红肿热痛
- C、术后 3 日切口疼痛加剧 D、术后 3 日体温仍在 38℃ 以上

第 6 页共 11 页

注意：答案请不要做在试题纸上  
试卷编号：308

- 95、一名脑外科病人，目前呼唤能睁眼，回答问题吐字不清，肢体异常屈曲，以格拉斯昏迷计分法进行评分的结果，正确的是  
A、评7分 B、评8分 C、评9分 D、评10分
- 96、颅内出血是脑手术后最危险的并发症，多发生在术后  
A、24-48h内 B、72h内 C、72h以上 D、一周后
- 97、脑室引流的位置是：引流管开口  
A、高于侧脑室30cm B、高于侧脑室10-15cm  
C、低于侧脑室10-15cm D、低于侧脑室30cm
- 98、临床上用20%的甘露醇降低颅内压，正确的使用方法是：  
A、快速静推 B、15~30分钟内静滴完250ml，1次/d  
C、15~30min内静滴完250ml，2~4次/d D、1~2h内静滴完250ml，2~4次/d
- 99、某男性，18岁，不慎从树上掉下，后枕部着地后，有意识障碍约15min，清醒后有逆行性遗忘，并有头痛、恶心、呕吐，最可能的诊断是：  
A、脑挫伤 B、脑震荡 C、硬膜下血肿 D、硬膜外血肿
- 100、肾盂造瘘者不作常规冲洗的原因是：  
A、避免出血 B、以免引起感染 C、以免引起病人疼痛 D、避免肾盂漏口外渗
- 101、TUR综合征出现的原因是  
A、大量冲洗液的吸收 B、出血过多 C、神经放射 D、手术损伤
- 102、输尿管结石引起的血尿常出现在：  
A、晨间第一次尿 B、夜尿 C、卧床休息时 D、绞痛时
- 103、食管癌、贲门癌切除术后发生胃液反流，嘱病人  
A、饭后半h内不能平卧，并将枕头抬高 B、饭后1h内不能平卧，并将枕头抬高  
C、饭后2h内不能平卧，并将枕头抬高 D、饭后4h内不能平卧，并将枕头抬高
- 104、观察胸腔闭式引流水柱波动的幅度，下列哪项情况是不能反映的  
A、死腔大小 B、胸膜腔内负压的大小 C、肺扩张情况 D、胸腔引流量
- 105、王先生，驾车时因急刹车受伤，造成多根多处肋骨骨折，急救方法是：  
A、立即吸氧，止痛 B、应用胸腔闭式引流  
C、加压包扎固定胸部 D、肋骨牵引固定
- 106、食管癌切除术后，最严重的并发症是：  
A、脓胸 B、乳糜胸 C、吻合口瘘 D、吻合口狭窄
- 107、颈椎后路手术的病人，为了适应术中体位，术前应指导（ ）训练。  
A、俯卧位 B、仰卧后伸位 C、侧卧位 D、平卧位
- 108、保持有效牵引的方法下列哪项是错误的  
A、牵引重量不可随意增减 B、不可随意放松牵引绳  
C、牵引方向与远端肢体成直线 D、牵引绳与患肢长轴平行
- 109、女，60岁，走路不慎滑倒，右臀部着地，对判断是否有骨折最有诊断性意义的是：  
A、患髌疼痛，活动时加重 B、患肢呈外旋畸形  
C、走路跛行 D、患髌肿胀青紫
- 110、Codman三角主要见于：  
A、骨肉瘤 B、化脓性骨髓炎 C、髌关节脱位 D、髌关节结核
- 111、甲状腺大部切除术后，第3天饮水时发生呛咳，可能是  
A、喉头水肿 B、喉返神经损伤 C、喉上神经损伤 D、甲状旁腺损伤

第7页共11页

注意：答案请不要做在试题纸上  
试卷编号：308

- 112、下列哪项不属于结肠癌术前的常规肠道准备  
A、胃肠减压 B、前3日进少渣半流质饮食  
C、术前3日口服泻药 D、术前一日晚清洁灌肠
- 113、患者男性，32岁，因结节性甲状腺肿接受了甲状腺大部分切除术。手术顺利，术后安返病房。在术后48h内，护士最主要的观察内容是：  
A、呼吸 B、体温 C、伤口情况 D、引流
- 114、乳癌病人患乳皮肤出现“橘皮样”改变主要是由于：  
A、乳房Cooper韧带受肿瘤侵犯 B、乳管被癌细胞堵塞  
C、乳房内的静脉被癌细胞堵塞 D、乳房皮内和皮下淋巴管被癌栓堵塞
- 115、腹外疝术后护理中不正确的是：  
A、平卧3天，膝下垫一软枕 B、术后当日可进流食  
C、预防感染 D、早期下床活动
- 116、男性，32岁，既往有胃病史，近1周来常感上腹部不适，4h前突发上腹部剧烈疼痛，伴有恶心、呕吐。查体：腹部压痛、肌紧张，肝浊音界缩小。X线检查可见膈下游离气体，首先考虑：  
A、急性阑尾炎穿孔 B、胆囊炎穿孔  
C、急性胰腺炎 D、溃疡穿孔
- 117、最容易发生嵌顿的腹外疝是：  
A、腹股沟斜疝 B、腹股沟直疝 C、切口疝 D、股疝
- 118、原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是：  
A、腹痛性质不同 B、有无全身感染征象  
C、有无腹膜刺激征 D、腹腔有无原发病灶
- 119、刘某，因工伤造成腹部开放性损伤，有肠管脱出，现场处理原则：  
A、立即向腹腔还纳 B、等渗盐水冲洗后敷料包扎  
C、清洁器皿覆盖后再包扎 D、及早行清创术
- 120、某男性，35岁，肛门疼痛3天，局部有肿物突出，无便血。查体：体温36.5℃，肛门外有0.7cm直径的肿物、稍硬，呈暗紫色，触痛明显，外表皮肤光滑、边界清楚。最可能的诊断是：  
A、肛门周围皮下脓肿 B、外痔血栓形成 C、直肠息肉 D、肛裂

二、多选题（占20%，60分，每题2分，30道题）

- 1、医院特级护理包括下列哪几项内容：  
A、制定护理计划 B、备好急救药品和用物 C、每10-15min巡视一次  
D、做好基础护理 E、记录24h出入量
- 2、患者平卧位时压疮的好发部位有  
A、骶尾部 B、肩胛部 C、髌部 D、足跟部和踝部 E、肘部
- 3、下列哪几项属于脉搏强弱异常  
A、交替脉 B、奇脉 C、重搏脉 D、间歇脉 E、水冲脉
- 4、常用药物过敏试验的正确剂量是  
A、青霉素200-500u/0.1ml B、链霉素250u/0.1ml C、TAT 15u/0.1ml  
D、细胞色素C 0.075mg/0.1ml E、头孢菌素类50ug/0.1ml
- 5、下列属于临时医嘱的是

第8页共11页

注意：答案请不要做在试题纸上  
试卷编号：308

- A、安定 10mg St      B、肥皂水灌肠 HS      C、空腹抽血明晨  
D、先锋霉素 VI 0、25 q4h      E、Vit B12 500mg qod
- 6、下列抗结核药物中，属于抑菌剂的是  
A、利福平    B、链霉素    C、吡嗪酰胺    D、乙胺丁醇    E、对氨基水杨酸
- 7、下列属于哮喘急性发作重度病情表现的是  
A、稍事活动便有喘息      B、只能单字讲话      C、端坐呼吸  
D、脉率 100～120 次/分      E、PaO<sub>2</sub><60mmHg
- 8、慢性心力衰竭的诱因包括  
A、呼吸道感染      B、心房颤动      C、情绪激动  
D、钾盐摄入过多      E、妊娠
- 9、下列关于使用利尿剂的护理措施正确的是  
A、使用袢利尿剂时注意补充钾盐      B、口服补钾宜在饭前，以免影响吸收  
C、外周静脉补钾时每 500ml 液体中 KCl 含量不宜超过 3g  
D、肾功能不全者禁用螺内酯      E、若非紧急情况宜选择早晨或日间应用
- 10、截瘫病人最常见的并发症是  
A、褥疮    B、急性心衰    C、泌尿系统感染    D、营养不良    E、肺部感染
- 11、急性肾小球肾炎病人应卧床休息，直至  
A、血沉正常    B、血常规正常    C、镜下血尿消失  
D、水肿消退    E、血压恢复正常
- 12、下列关于上消化道出血量的估计，叙述正确的是  
A、大便隐血试验阳性提示每天出血量>5～10ml  
B、出现黑便表明出血量在 50～70ml 以上  
C、胃内积血量在 150～200ml 时可引起呕血  
D、出血量超过 300～400ml 可出现头晕、心悸、乏力等症状  
E、出血量超过 1000ml，临床出现急性周围循环衰竭的表现
- 13、以下关于慢性肾小球肾炎的饮食护理，正确的是  
A、蛋白质 1.0-1.5g/(kg.d)      B、50%以上为优质蛋白  
C、增加碳水化合物摄入      D、控制磷的摄入  
E、补充维生素和锌
- 14、甲状腺功能亢进病人的眼部护理正确的是  
A、外出戴深色眼镜    B、睡前涂眼药膏    C、每天做眼球运动以改善眼肌功能  
D、高钠饮食      E、低枕平卧
- 15、下列有关三腔二囊管的护理正确的是  
A、先向食管囊注气，再向胃囊注气    B、管外以绷带连接 1kg 沙袋  
C、经胃管冲洗胃腔      D、气囊压迫一般以 3～4 天为限  
E、出血停止后口服 20-30ml 石蜡油立即拔管
- 16、下列关于特发性血小板减少性紫癜的临床特点叙述正确的是  
A、急性型多见于儿童；慢性型以成年女性多见  
B、急性型起病前常有上呼吸道感染史；慢性型起病缓慢，不易察觉  
C、急性型常出现内脏出血；慢性型不出现内脏出血  
D、两型均可有贫血  
E、急性型病程多为自限性；慢性型持续数周、数月、数年不等

第 9 页共 11 页

注意：答案请不要做在试题纸上  
试卷编号：308

- 17、糖尿病患者的饮食疗法应为  
A、尽量少吃主食    B、禁食甜味水果    C、饮食应定时定量  
D、蛋白质应占每日总热量的 15%      E、多食富含纤维素的食物
- 18、防止疝修补术后复发的措施是  
A、防止上呼吸道感染      B、取半卧位      C、保持大小便道畅  
D、早期下床活动      E、卧床 3-6 天
- 19、腹部闭合性损伤，出现下列那些情况应考虑有内脏损伤  
A、早期出现休克      B、肝浊音界消失      C、持续性剧烈疼痛  
D、有呕血或黑便      E、有明显的腹膜刺激征
- 20、颅内高压症病人下列护理措施中哪项是错误的  
A、抬高床头 15-30 度    B、给低流量持续吸氧    C、给适量的吗啡缓解头痛  
D、防止颈部过屈过伸或扭曲      E、平卧位，头侧向患侧
- 21、与格拉斯哥昏迷计分法不符的是  
A、呼唤睁眼 3 分    B、吐字不清 4 分    C、回答错误 3 分  
D、定痛部位 6 分    E、回答正确 5 分
- 22、开放性气胸迅速封闭胸壁伤口的目的是  
A、使其转变为闭合性气胸    B、防止胸壁进一步凹陷    C、恢复胸膜腔负压  
D、消灭“反常呼吸”运动    E、消除纵隔摆动
- 23、膀胱冲洗时的要求  
A、水温应保持在 35-37℃      B、根据膀胱引流液的颜色调节冲洗液的速度  
C、膀胱手术后每次冲洗量宜<100ml    D、有膀胱出血时应用冷冲洗液  
E、常规记录每次冲洗所用的液量
- 24、骨折特有的并发症  
A、损伤性休克    B、内脏损伤    C、骨筋膜室综合症  
D、神经损伤    E、脂肪栓塞综合症
- 25、腰椎间盘突出症的护理要点  
A 卧硬板床休息 3-4 周    B、急性期过后指导病人做腰背肌肉、腹肌功能锻炼  
C、指导患者养成良好的工作、劳动姿势    D、术后早期行直腿抬高练习  
E、骨盆牵引正确的按摩、理疗有一定效果
- 26、甲状腺次全切除后并发症可有：  
A、呼吸困难和窒息    B、误咽、呛咳    C、声音嘶哑  
D、甲状腺危象    E、手足抽搐
- 27、评判性思维的特征表现为  
A、主动思考      B、质疑和反思  
C、审慎      D、开放      E、见异思迁
- 28、护理诊断的内容包括：  
A、病人疾病的行为反应      B、护理对象生命过程的反应  
C、病人疾病的病理变化      D、病人生理、心里、社会等影响健康的问题  
E、病人的治疗变化
- 29、健康促进是指干预对人体健康有害的：  
A、心理状态    B、生活方式    C、生活环境    D、生活行为    E、生理状态

第 10 页共 11 页

注意：答案请不要做在试题纸上  
试卷编号：308

- 30、王女士，68 岁，股骨颈骨折，人工股骨头置换术术后需卧床两个月。病人可能出现的健康问题是：ACDE
- A、有皮肤完整性受损的危险

B、有体液不足的危险

C、有下肢血管栓塞的危险

D、有泌尿系结石的危险

E、有便秘的危险

三、问答题（病例分析）（占 20%，60 分，每题 20 分，3 道题）

- 1、王某，男性，32 岁，因车祸后出血较多被送入当地医院治疗。入院时 BP 89/52 mmHg, P: 106 次/min，医嘱给予输液、输血。患者因贫血输注过三次红细胞悬液。护士取血后进行核对，ABO 与 Rh 血型相符，直接和间接交叉配血试验阴性。再给予输血。大约十多分钟后该患者出现皮肤瘙痒，继而后又出现荨麻疹，请问：
- (1) 该病人可能出现什么情况？（2 分）

(2) 可能是什么原因所致？（6 分）

(3) 针对这种情况如何预防和处理？（12 分）

- 2、患者张某，34 岁，10 余天前无明显诱因出现发热，伴咳嗽、咳痰，稍有胸闷，自行应用抗感染治疗效果不理想而来院就诊。入院时患者感头晕，胸闷，反应迟钝，查体：T: 38.5℃ P: 80 次/分 R: 20 次/分 BP: 110/70mmHg。查血常规：WBC  $182.51 \times 10^9/L$ 、HGB 87g/L、PLT  $16 \times 10^9/L$ ，血百分：原始 78%。腹部 B 超示肝、脾肿大。骨穿结果显示为急性白血病（M1 型）。问：
- (1) 患者入院时头晕、胸闷、反应迟钝，你认为可能原因是什么？应如何护理？（6 分）

(2) 除上述护理问题外，目前患者最主要的护理问题是什么？针对此问题采取哪些护理措施？（7 分）

(3) 入院三天后行化疗。化疗期间的主要护理问题有哪些？（7 分）

- 3、王某，男性，40 岁，半年前因性情急躁、失眠、体重减轻，到医院就诊，诊断为中度原发性甲状腺功能亢进症，用药后三个月症状明显好转，但最近一个月来上述症状再次出现且有加重迹象，遂入院行手术治疗。经三天术前准备后，昨日下午 14 点在全麻下行甲状腺大部分切除术，今晨 6 点出现烦躁不安，大汗，呕吐及水泻，T: 40℃，P: 126 次/min。问：
- (1) 患者可出现了什么情况？该如何处理？（10 分）

(2) 出现上述情况的可能原因是什么？应如何避免？（10 分）